

離岸風力發電第二期計畫

環境監測

(期間：112年12月至113年2月)

開發單位：台灣電力股份有限公司

執行監測單位：光宇工程顧問股份有限公司

提送日期：中華民國 113 年 8 月

目 錄

目 錄

前 言.....	前-1
第一章 監測內容概述	1-1
1.1 開發計畫內容及工程進度	1-1
1.2 監測情形概述.....	1-3
1.3 監測計畫概述.....	1-9
1.4 監測方法概述.....	1-11
1.5 監測位址.....	1-26
1.6 品保／品保作業措施概要	1-34
1.6.1 鯨豚生態.....	1-34
1.6.2 鳥類生態.....	1-37
1.6.3 物化分析.....	1-43
1.6.4 陸域生態.....	1-48
1.6.5 陸域施工考古監看	1-51
第二章 監測結果數據分析	2-1
2.1 候鳥衛星繫放.....	2-1
2.2 鳥類雷達監測.....	2-11
2.2.1 活動時間.....	2-15
2.2.2 飛行高度.....	2-16
2.2.3 飛行方向.....	2-18
2.2.4 飛行速度.....	2-20
2.3 陸域鳥類.....	2-21
2.4 陸域生態.....	2-25
2.5 營建噪音.....	2-46
2.6 空氣品質.....	2-48
2.7 文化資產.....	2-49

2.8 鯨豚生態.....	2-50
第三章 檢討與分析	3-1
3.1 監測結果檢討與因應對策	3-1
3.1.1 監測結果綜合檢討分析.....	3-1
3.1.2 監測結果異常現象因應對策.....	3-36
3.2 建議事項.....	3-36
參考文獻.....	參-1

附錄一 檢測單位之認證資料

附錄二 採樣與分析方法

附錄三 品保/品管查核紀錄

附錄四 原始調查報告

附錄五 調查作業照片記錄

表 目 錄

表一	本季環境監測工作執行之分工	前-2
表 1.1-1	本開發計畫工程進度表	1-2
表 1.2-1	環境監測結果及因應對策	1-3
表 1.2-1	環境監測結果及因應對策 (續 1).....	1-4
表 1.2-1	環境監測結果及因應對策 (續 2).....	1-5
表 1.2-1	環境監測結果及因應對策 (續 3).....	1-6
表 1.2-1	環境監測結果及因應對策 (續 4).....	1-7
表 1.2-1	環境監測結果及因應對策 (續 5).....	1-8
表 1.3-1	本計畫環境監測工作項目	1-9
表 1.3-1	本計畫環境監測工作項目(續).....	1-10
表 1.4-1	雷達系統規格表	1-14
表 1.4-2	環境物化調查檢測方法彙整表	1-17
表 1.6.3-1	空氣品質採樣至運輸過程中注意事項	1-44
表 1.6.3-2	噪音監測過程中注意事項	1-45
表 1.6.3-3	環境監測數據品質目標值	1-47
表 2.1-1	本季衛星追蹤候鳥與追蹤現況	2-1
表 2.1-2	太平洋金斑鴿編號 7097 於 111 年春季遷移出海航高資訊 2-5	
表 2.1-3	太平洋金斑鴿編號 7097 於 112 年春季遷移出海航高資訊 2-7	
表 2.2-1	本季雷達調查日期及相關資訊	2-11
表 2.2-2	112 年冬季雷達調查記錄表.....	2-14
表 2.3-1	本季海岸鳥類調查結果統計表	2-22
表 2.3-1	本季海岸鳥類調查結果統計表(續).....	2-23
表 2.3-2	本季海岸鳥類保育類位置	2-23
表 2.4-1	本季調查植物種類歸隸特性統計表	2-26
表 2.4-2	本計畫調查範圍稀有植物資料表	2-28
表 2.4-3	本季調查範圍植物樣區環境資料	2-31
表 2.4-4	本季調查範圍森林樣區木本植物組成表	2-31
表 2.4-5	本季調查範圍森林樣區木本植物總合分析表	2-31
表 2.4-6	本季調查範圍森林樣區地被植物組成表	2-32
表 2.4-7	本季調查範圍森林樣區地被植物總合分析表	2-33

表 2.4-8	本季調查範圍草生地樣區植物組成表	2-34
表 2.4-9	本季調查範圍草生地樣區植物總合分析表	2-35
表 2.4-10	本季調查範圍森林樣區木本植物多樣性指數表	2-36
表 2.4-11	本季調查範圍森林樣區地被植物多樣性指數表	2-37
表 2.4-12	本季調查範圍草生地樣區植物多樣性指數表	2-37
表 2.4-13	本季哺乳類資源表	2-38
表 2.4-14	本季鳥類資源表	2-40
表 2.4-15	本季爬蟲類資源表	2-42
表 2.4-16	本季蝶類資源表	2-44
表 2.4-17	本季調查蜻蜓資源表	2-45
表 2.5-1	本季營建噪音監測結果分析表	2-46
表 2.5-2	本季營建低頻噪音監測結果分析表	2-47
表 2.6-1	本季空氣品質監測結果分析表	2-48
表 2.8-1	本季海上目視調查目擊以及里程與小時記錄表	2-50
表 2.8-2	調查及資料解析時間	2-52
表 2.8-3	各點位之鯨豚哨叫聲偵測分析結果	2-55
表 2.8-4	各點位之鯨豚喀答聲偵測分析結果	2-56
表 3.1.1-1	候鳥衛星繫放各鳥隻追蹤結果	3-2
表 3.1.1-2	候鳥衛星繫放本季與上季、去年同季 監測結果比對表	3-3
表 3.1.1-3	鳥類雷達監測本季與上季、去年同季及環說時期同季監 測結果比對表	3-5
表 3.1.1-4	鳥類雷達監測歷年監測結果	3-6
表 3.1.1-5	海岸鳥類本季與上季、去年同季及環說時期同季監測結 果比對表	3-8
表 3.1.1-6	歷次海岸鳥類監測結果	3-9
表 3.1.1-7	植物本季與上季、去年同季及環說時期同季監測結果比 對表.....	3-15
表 3.1.1-8	植物歷次監測結果	3-15
表 3.1.1-9	哺乳類本季與上季、去年同季及環說時期同季監測結果 比對表	3-16
表 3.1.1-10	哺乳類歷次監測結果	3-16
表 3.1.1-11	鳥類本季與上季、去年同季及環說時期同季監測結果比 對表.....	3-17
表 3.1.1-12	鳥類歷次監測結果	3-17
表 3.1.1-13	爬蟲類本季與上季、去年同季及環說時期同季監測結果	

比對表	3-18
表 3.1.1-14 爬蟲類歷次監測結果	3-18
表 3.1.1-15 兩棲類本季與上季、去年同季及環說時期同季監測結果 比對表	3-19
表 3.1.1-16 兩棲類歷次監測結果	3-19
表 3.1.1-17 蝶類本季與上季、去年同季及環說時期同季監測結果比 對表.....	3-20
表 3.1.1-18 蝶類歷次監測結果	3-20
表 3.1.1-19 蜻蜓類本季與上季、去年同季及環說時期同季監測結果 比對表	3-21
表 3.1.1-20 蜻蜓類歷次監測結果	3-21
表 3.1.1-21 本季與上季、去年同季營建噪音監測結果比對表	3-23
表 3.1.1-22 營建噪音歷次監測結果	3-24
表 3.1.1-23 營建低頻噪音歷次監測結果	3-25
表 3.1.1-24 本季與上季、去年同季及環說時期空氣品質監測結果比 對表.....	3-28
表 3.1.1-25 空氣品質歷次監測結果.....	3-29
表 3.1.1-26 本季與上季及環說時期同季鯨豚生態(一般視覺監測) 結 果比對表	3-34
表 3.1.1-27 鯨豚生態(一般視覺監測)歷次監測結果.....	3-34
表 3.1.1-28 本季與上季及環說時期同季鯨豚生態(水下聲學監測) 結 果比對表	3-35
表 3.1.1-29 鯨豚生態(水下聲學監測)歷次結果.....	3-36
表 3.1.2-1 本季監測之異常狀況及處理情形	3-36

圖目錄

圖 1.1-1	本計畫開發場址位置圖	1-2
圖 1.4-1	鯨豚調查工作流程示意圖 (A~C 為主要觀察位置，D 為記錄位置).....	1-11
圖 1.4-2	裝載於船上之雷達系統	1-14
圖 1.4-3	雷達回波圖說明	1-15
圖 1.4-4	Debut MINI(2G、4G)太陽能衛星發報器	1-16
圖 1.4-5	Debut OMNI(3G)太陽能衛星發報器	1-17
圖 1.5-1	鯨豚測線圖	1-26
圖 1.5-2	水下聲學監測點位圖	1-27
圖 1.5-3	候鳥繫放執行捕抓繫放範圍及風場相對位置圖	1-28
圖 1.5-4	雷達調查定點及風場相對位置圖	1-29
圖 1.5-5	陸域物化監測位置示意圖	1-30
圖 1.5-6	陸域生態調查範圍示意圖	1-31
圖 1.5-7	陸域鳥類調查範圍示意圖	1-32
圖 1.6-1	作業流程圖	1-34
圖 1.6.2-1	採樣分析標準流程圖	1-38
圖 1.6.3-1	採樣分析標準流程圖	1-46
圖 1.6.4-1	採樣分析標準流程圖	1-48
圖 2.1-1	太平洋金斑鵠編號 7097 在 111 年 4 月 24 日出海遷移路徑.....	2-3
圖 2.1-2	太平洋金斑鵠編號 7097 在 111 年 4 月 24 日出海期間飛行航高	2-4
圖 2.1-3	太平洋金斑鵠編號 7097 在 111 年秋季南遷(紅色)路徑及 112 年春季北返(綠色)路徑	2-5
圖 2.1-4	太平洋金斑鵠編號 7097 在 112 年 5 月 2 日出海遷移路徑(綠色).....	2-5
圖 2.1-5	太平洋金斑鵠編號 7097 在 112 年 5 月 2 日出海期間飛行航高.....	2-6
圖 2.1-6	太平洋金斑鵠編號 7097 在 111 年春季北返(白色)、秋季南遷(紅色)路徑及 112 年春季北返(綠色)路徑	2-7
圖 2.1-7	現場繫放照片-太平洋金斑鵠編號(0C07)	2-8
圖 2.1-8	太平洋金斑鵠編號 0C07 繫放後之活動定位點.....	2-8
圖 2.1-9	現場繫放照片-太平洋金斑鵠編號(0C05)	2-9

圖 2.1-10	太平洋金斑鴿編號 0C05 繫放後之活動定位點.....	2-9
圖 2.1-11	現場繫放照片-太平洋金斑鴿編號(0C01)	2-10
圖 2.1-12	太平洋金斑鴿編號 0C01 繫放後之活動定位點.....	2-10
圖 2.2-1	112 年冬季雷達回波圖.....	2-12
圖 2.2-1	112 年冬季雷達回波圖(續 1).....	2-13
圖 2.2-1	112 年冬季雷達回波圖(續 2).....	2-14
圖 2.2.1-1	112 年冬季垂直雷達調查時間分佈.....	2-15
圖 2.2.1-2	112 年冬季水平雷達調查時間分佈.....	2-15
圖 2.2.2-1	112 年冬季垂直雷達調查高度分佈.....	2-16
圖 2.2.2-2	112 年冬季垂直雷達日間調查高度分佈.....	2-17
圖 2.2.2-3	112 年冬季垂直雷達夜間調查高度分佈.....	2-17
圖 2.2.3-1	112 年冬季日間(左)及夜間(右)鳥類飛行軌跡 ...	2-18
圖 2.2.3-2	112 年冬季水平雷達調查鳥類飛行方向.....	2-19
圖 2.2.3-3	112 年冬季水平雷達日間(左)及夜間(右)調查鳥類 飛行方向	2-19
圖 2.2.4-1	112 年冬季水平雷達調查追蹤距離超過 1 公里軌跡之飛 行速度	2-20
圖 2.3-1	本季海岸鳥類調查保育類物種分布圖	2-23
圖 2.4-1	本季稀有植物分布位置圖	2-28
圖 2.4-2	本季保育類鳥類分布位置圖	2-41
圖 2.8-1	本季鯨豚目視調查之軌跡路線圖	2-51
圖 2.8-2	本計畫風場 TPC-1~TPC-5 環境噪音時頻譜圖	2-53
圖 2.8-3	TPC-1~TPC-5 環境噪音 1-Hz band 累積機率分布	2-54
圖 3.1.1-1	歷次營建噪音均能音量值及最大音量值變化圖	3-26
圖 3.1.1-2	歷次營建低頻噪音均能音量值變化圖	3-27
圖 3.1.1-3	歷次總懸浮微粒 TSP 24 小時值變化圖	3-30
圖 3.1.1-4	歷次懸浮微粒 PM ₁₀ 24 小時值變化圖	3-30
圖 3.1.1-5	歷次細懸浮微粒 PM _{2.5} 24 小時值變化圖	3-31

前 言

前 言

一、依據

為配合國家政府政策，經濟部於 2015 年 7 月 2 日公告「離岸風力發電規劃場址申請作業要點」，公告潛力場址，以利業者提早準備進行離岸風場規劃與開發。為配合國家政策並響應政府 2025 非核家園目標，台灣電力股份有限公司（以下簡稱台電公司）擬定「離岸風力發電第二期計畫」（以下簡稱本計畫），期望在符合國防、飛航安全、視覺景觀、海岸環境、人文社經及生態保育等因素考量下，達到未來離岸風力發電之開發目標，為台灣綠色能源之開發盡一份心力。

本計畫於 107 年 1 月 17 日經行政院環境部環境影響評估審查委員會第 324 次會議審查通過，民國 107 年 2 月 9 日經環署綜字第 1070012620 號函公告審查結論，且本計畫環境影響說明書定稿本已於 107 年 4 月 26 日經環署綜字第 1070019120 號函核准備查在案；於 110 年辦理本計畫第一次變更內容對照表(變更環境監測計畫)，並於民國 111 年 1 月 4 日取得第一次變更內容對照表定稿本核備函(環署綜字第 1100082372 號函)；本計畫第二次變更內容對照表(變更審查結論及明確鯨豚保護對策之後續管制措施)於民國 113 年 1 月 25 日取得定稿本核備函(環部保字第 1130000027 號函)，茲依據核定之環境監測計畫內容據以執行。

二、監測執行期間

依據核定之環境監測計畫內容，將辦理施工前階段、施工階段及營運階段環境監測工作，其中海域工程預計於 113 年 3 月開始施工，故規劃於 110 年開始執行海域施工前環境監測工作；陸域工程於 111 年 9 月開始施工，同時開始執行陸域施工階段環境監測工作，並按季編撰環境監測報告。本報告為海域施工前暨陸域施工階段環境監測報告。

三、執行監測單位

本監測計畫由光宇工程顧問股份有限公司統籌，並且分別委請環境部認可之合格檢測機關、專業調查公司及學術單位等共同執行辦理，再由光宇公司負責編撰環境監測報告。有關本季環境監測工作執行之分工如表一所示。

表一 本季環境監測工作執行之分工

類別	監測項目	執行單位
鯨豚生態	鯨豚生態調查	費思未來有限公司
		洋聲股份有限公司
鳥類生態	雷達調查 (包含水平及垂直方向)	弘益生態有限公司
	候鳥衛星繫放	國立屏東科技大學野生動物保護研究所
文化資產	水下文化層判釋	龍門顧問有限公司
漁業經濟	整理分析漁業年報中有關漁業經濟資料(漁船數目、漁業活動形式、魚種、漁獲量)	科海生態顧問有限公司
營建噪音	1. 低頻 (20 Hz~200 Hz 量測 L_{eq}) 2. 一般頻率 (20Hz~20kHz 量測 L_{eq} 及 L_{max})	瑩諮環境科技股份有限公司
空氣品質	1. 風向、風速 2. 粒狀污染物(TSP、PM ₁₀ 、PM _{2.5})、SO ₂ 、NO _x (NO、NO ₂)、CO、O ₃	瑩諮環境科技股份有限公司
陸域生態	陸域動、植物生態 (依據環境部動、植物技術規範執行)	弘益生態有限公司
鳥類生態 (陸域鳥類)	種類、數量、棲身及活動情形、飛行路徑、季節性之族群變化等 (含岸邊陸鳥及水鳥)	弘益生態有限公司
文化資產	陸域施工考古監看	龍門顧問有限公司

第一章

監測內容概述

第一章 監測內容概述

1.1 開發計畫內容及工程進度

一、本計畫開發內容：

- (一) 離岸風場海域：本計畫風場位於彰化縣彰濱工業區外海，為「離岸風力發電規劃場址申請作業要點」公告之 26 號潛力場址，本潛力場址與臺灣本島最近距離約 9.7 公里，面積約 50.4 平方公里，水深範圍介於 37~49 公尺。本計畫風機位置已避開白海豚重要棲息區域、重要野鳥棲地、螻蛄蝦繁殖保育區、漢寶溼地、保護礁區、航道、軍事禁限建及相關開發計畫。
- (二) 本計畫風機單機裝置容量為 9.5 MW，規劃設置 31 座風力發電機組，總裝置容量 294.5 MW。
- (三) 海底電纜工程：本計畫離岸風場內之 66kV 陣列海纜連接至海上變電站，利用變壓器升壓後，以 161kV 海纜輸出鋪設至淺水海域後，再利用「北側共同岸廊道」引接至彰濱工業區本公司既有彰工電廠內之人孔上岸。
- (四) 輸配電陸上設施工程：人孔轉接成陸纜後，初步規劃以 161kV 陸纜並採六回線佈設方式，採沿地下電纜廊道銜接電氣室後，最終併入預定新設之彰工升壓站。




圖 1.1-1 本計畫開發場址位置圖

二、工程進度：

本開發計畫主要分為陸域工程及海域工程，陸域工程主要為陸域電纜等陸上設施之施作，業於 111 年 9 月開始陸域施工，而海域工程則主要為風力機組設置及海域電纜等相關設施之施作，預計於 113 年 3 月開始施工。本開發計畫至 113 年 2 月底陸域工程進度表如表 1.1-1 所示，本季預定進度為 48.55%，實際執行進度為 46.84%。

表 1.1-1 本開發計畫工程進度表

工程	預定進度 (%)	實際進度 (%)	本季執行工程項目
陸域工程	48.55%	46.84%	電氣室二樓結構體工程。
海域工程	0%	0%	尚未開始海域工程施工。

1.2 監測情形概述

本計畫目前執行海域施工前暨陸域施工階段監測，112 年第四季之環境監測結果，經彙整摘要如表 1.2-1 所示。

表 1.2-1 環境監測結果及因應對策

類別	監測項目	監測時間	監測結果摘要	因應對策
鯨豚生態	一般視覺監測	112.12.09 113.01.31 113.02.01	本季共執行 3 趟次海上鯨豚調查，海上調查航行總里程 443.0 公里，總時間 34.02 小時，穿越線上里程 159.2 公里，穿越線上時間 11.60 小時，本季調查未目擊鯨豚，標準目擊率為 0。	調查期間無異常情形。
	水下聲學監測	112.12.09(儀器佈放) 112.12.22(儀器回收)	本季鯨豚偵測分析結果顯示，5 個測站皆有偵測到鯨豚活動跡象，哨叫聲偵測率介於 4.8%~6.5%，以 TPC-5 偵測率最高，喀答聲偵測率介於 4.8%~6.3%，以 TPC-1 及 TPC-2 的偵測率最高。	調查期間無異常情形。

表 1.2-2 環境監測結果及因應對策 (續 1)

類別	監測項目	監測時間	監測結果摘要	因應對策
	雷達調查(包含水平及垂直方向)	112.12.26 113.01.29 113.01.30 113.01.31 113.02.17	<p>本季於 112 年 12 月 26 日、113 年 1 月 29 日、1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 17 日，共執行雷達調查 5 次。</p> <p>一、活動時間 調查結果顯示在夜間有較多鳥類飛行活動。</p> <p>二、飛行高度 依據鳥類飛行高度資料，鳥類過境期間最主要利用的飛行高度為 150 至 200 公尺高度之空域。</p> <p>三、飛行方向 依據冬季水平雷達分析，可發現主要的飛行方向為朝向南南西方飛行。</p> <p>四、飛行速度 主要的鳥類飛行速度區間為 5-8 m/s。</p>	調查期間無異常情形。
鳥類生態	候鳥衛星繫放	113.02.25 113.02.28	<p>本計畫已執行 10 隻次候鳥衛星繫放作業(冬候鳥)並於 112 年第一季增加候鳥追蹤樣本數，共 5 隻黃足鵝，112 年第三季增加繫放 1 隻太平洋金斑鵒，本季新增繫放 2 隻太平洋金斑鵒，以下針對本季各鳥種追蹤成果摘述說明。</p> <p>太平洋金斑鵒：本季共追蹤 4 隻。編號 7097 之個體發報器於 112 年 6 月 1 日後即無成功定位，並於後續回傳數天沒有資料的空號後即再無訊號回傳。編號 0C07 之個體於 112 年 10 月 18 日繫放，該個體在 10 月 19 日傍晚失去訊號，並未再有訊號回傳，研究人員前往最後定位點現場搜尋未果。編號 0C05 及 0C01 個體目前活動於彰化沿海地區。</p>	調查期間無異常情形。

表 1.2-3 環境監測結果及因應對策 (續 2)

類別	監測項目	監測時間	監測結果摘要	因應對策
營建噪音	1. 低頻 (20 Hz~200 Hz 量測 L_{eq}) 2. 一般頻率 (20Hz~20kHz 量測 L_{eq} 及 L_{max})	112.12.12 113.01.15 113.02.23	一、營建低頻噪音 本季營建低頻噪音監測結果低頻之均能音量 $L_{eq,LF}$ 測值介於 40.0~43.4dB(A)，本季測站各測值均符合參考之第四類營建工程低頻噪音管制標準值。 二、營建噪音 本季營建噪音監測結果之均能音量 L_{eq} 測值介於 58.4~63.3dB(A)，最大音量 L_{max} 介於 66.8~74.7dB(A)，本季測站各測值均符合第四類營建工程噪音管制標準。	調查期間無異常情形。
空氣品質	1. 風向、風速 2. 粒狀污染物 (TSP、 PM_{10} 、 $PM_{2.5}$)、 SO_2 、 NO_x (NO、 NO_2)、CO、 O_3	112.12.09~11	本季空氣品質監測結果，各測站 TSP 24 小時值介於 91~106 $\mu g/m^3$ ， PM_{10} 日平均值介於 47~55 $\mu g/m^3$ ， $PM_{2.5}$ 24 小時值介於 26~32 $\mu g/m^3$ ， SO_2 日平均值介於 0.002~0.003ppm， NO_x 日平均值介於 0.014~0.015ppm，NO 日平均值介於 0.002~0.003ppm， NO_2 日平均值介於 0.011~0.012ppm，CO 最大小時平均值介於 0.5~0.7ppm， O_3 最大小時平均值介於 0.058~0.059ppm，本季空氣品質監測結果，各測站各測值均符合空氣品質標準值。	調查期間無異常情形。

表 1.2-4 環境監測結果及因應對策 (續 3)

類別	監測項目	監測時間	監測結果摘要	因應對策
陸域生態	陸域動、植物生態 (依據環境部動、植物技術規範執行)	【陸域植物】 113.01.08~11 及 【陸域動物】 113.01.02~05	<p>本季於 113 年 1 月 8 日~11 日執行植物調查，1 月 2 日~5 日執行陸域動物調查執行，調查結果如下。</p> <p>一、陸域植物：</p> <p>共記錄維管束植物 29 科 68 屬 77 種，以草本植物佔 67.5%最多，喬木佔 13.0%次之；物種組成中有 46.8%為原生種。</p> <p>二、陸域動物：</p> <p>1.哺乳類記錄 1 目 1 科 1 種，僅衝擊區發現 1 目 1 科 1 種，為臭鼩 1 隻次，對照區未記錄物種。</p> <p>2.鳥類記錄 7 目 19 科 30 種，衝擊區記錄 5 目 11 科 12 種，共記錄 36 隻次，其中以麻雀 6 隻次最高，佔總數量的 16.7%，其餘物種數量介於 1~5 隻次；對照區 7 目 19 科 30 種，共記錄 210 隻次，其中以東方環頸鴿 30 隻次最多，佔總數量的 14.3%，其次為麻雀 (16 隻次，佔 7.6%)。記錄記錄 5 種特有亞種，分別為南亞夜鷹、小雨燕、白頭翁、褐頭鷓鴣及大卷尾及紅隼 1 種其他應予保育之野生動物。</p>	調查期間無異常情形。

表 1.2-5 環境監測結果及因應對策 (續 4)

類別	監測項目	監測時間	監測結果摘要	因應對策
陸域生態	陸域動、植物生態 (依據環境部動、植物技術規範執行)	<p>【陸域植物】 113.01.08~11 及 【陸域動物】 113.01.02~05</p>	<p>二、陸域動物： (續) 3.爬蟲類記錄 1 目 1 科 2 種 14 隻次，衝擊區為疣尾蝎虎 3 隻次；對照區為疣尾蝎虎 8 隻次及無疣蝎虎 3 隻次。 4.兩棲類由於本季調查為冬季，兩棲類活動頻度較低及缺乏水域環境供兩生類棲息，故未記錄到物種。 5.蝶類記錄 1 目 3 科 5 種 25 隻次，衝擊區記錄 1 目 3 科 4 種，衝擊區共記錄 9 隻次，物種數量介於 2~3 隻次；對照區記錄 1 目 3 科 4 種，以白粉蝶隻次最多，其餘各物種數量介於 3~6 隻次。 6.蜻蜓類記錄 1 目 1 科 1 種 9 隻次，衝擊區僅記錄薄翅蜻蜓 1 種 3 隻次；對照區僅記錄薄翅蜻蜓 1 種 5 隻次。</p>	調查期間無異常情形。

表 1.2-6 環境監測結果及因應對策 (續 5)

類別	監測項目	監測時間	監測結果摘要	因應對策
鳥類生態 (陸域鳥類)	種類、數量、棲身及活動情形、飛行路徑、季節性之族群變化等(含岸邊陸鳥及水鳥)	112.12.12 113.01.02 113.02.07	本季(12~2月)進行3次調查，共記錄9目25科53種701隻次，物種為南亞夜鷹、小雨燕、紅隼、八哥、白尾八哥及家八哥等。共紀錄6種臺灣特有亞種，物種為南亞夜鷹、小雨燕、白頭翁、褐頭鷓鴣、大卷尾及棕三趾等。保育類記錄3種珍貴稀有保育類野生動物，1種其他應予保育之野生動物，為紅尾伯勞。	調查期間無異常情形。
文化資產	陸域施工考古監看	—	本季無陸纜開挖或陸上設施開挖行為，故無需執行監看。	調查期間無異常情形。

1.3 監測計畫概述

本監測計畫各監測類別之監測項目、地點、頻率及執行單位如表 1.3-1 所示。

表 1.3-1 本計畫環境監測工作項目

類別	監測項目	地點	頻率	執行單位
鯨豚生態	鯨豚生態調查	一般視覺監測範圍 為本計畫風機海域 以及附近中華白海 豚棲地海域	施工前一年，進行一般 視覺監測總共 30 趟次 (不限定僅於 4 月到 9 月 執行，將平均分配調查 時間)	費思未來有限 公司
		水下聲學監測測站 共計 5 站	4 季，每季 14 天	洋聲股份有限 公司
鳥類生態	雷達調查 (包含水平 及垂直方向)	風場範圍	施工前兩年，每季進行 至少 5 天雷達掃描調查 (含日夜間)	弘益生態有限 公司
	候鳥衛星繫放	彰濱工業區海岸 (冬候鳥)	執行一次，10 隻次	國立屏東科技 大學野生動物 保護研究所
文化資產	水下文化層判釋	每部風機鑽孔取樣	考古專業人員進行判釋	龍門顧問有限 公司
營建噪音	1. 低頻 (20 Hz~ 200 Hz 量測 L_{eq}) 2. 一般頻率 (20Hz ~20kHz 量測 L_{eq} 及 L_{max})	電氣室	每月一次	瑩諮環境科技 股份有限公司

表 1.3-1 本計畫環境監測工作項目(續)

類別	監測項目	地點	頻率	執行單位
空氣品質	1.風向、風速 2.粒狀污染物(TSP、PM ₁₀ 、PM _{2.5})、SO ₂ 、NO _x (NO、NO ₂)、CO、O ₃	1. 蚵寮代天府 2. 秀傳醫院旁	每季 1 次，每次連續 24 小時監測	瑩諮環境科技股份有限公司
陸域生態	陸域動、植物生態（依據環境部動、植物技術規範執行）	陸域輸配電系統(陸纜及其附近範圍)	每季 1 次	弘益生態有限公司
鳥類生態(陸域鳥類)	種類、數量、棲身及活動情形、飛行路徑、季節性之族群變化等(含岸邊陸鳥及水鳥)	鄰近之海岸附近	每年夏季(6~8月)為每季 1 次，春、秋、冬候鳥過境期間(3~5月、9~11月及12~2月)為每月 1 次	弘益生態有限公司
文化資產	陸域施工考古監看	陸纜開挖範圍、陸上設施開挖處	每日監看	龍門顧問有限公司

1.4 監測方法概述

一、鯨豚生態

(一) 一般視覺監測

1. 採目視觀察法，租用安全合格船隻在海上進行 Z 字形穿越線調查。
2. 執行 30 趟次海上調查，並調查日期須涵蓋四季，航行於所設計之航線。出發前隨機抽取兩條航線及順序，兩條航線去程與回程的航行方向不同。海上航行時以手持式全球衛星定位系統(GPSmap 64ST, Garmin Corp., Taiwan)定位並記錄航行軌跡。
3. 每次調查至少有四人，其中兩人各於船隻左右側各負責搜尋左右兩側海面，第三人則協助搜尋船前方以及左右海面，觀察員以肉眼與持望遠鏡觀察海面是否有鯨豚出現，第四人作水質測量以及紀錄，並可做不同海面觀察以及略作休息。觀察人員約每 20 分鐘交換一次位置以避免對同一觀察區域產生心理上的疲乏，如下圖 1.4-1 所示。




圖 1.4-1 鯨豚調查工作流程示意圖 (A~C 為主要觀察位置，D 為記錄位置)

4. 調查期間，在浪級小於 4 級，能見度遠達 500 公尺以上，並且同時航行在設計穿越線時的觀察視為線上努力量(on-effort)；當船隻航行於進出港口與航線之間、或天氣狀況不佳難以進行有效觀測、及觀察海豚群體時，則視為「離線努力量」(off-effort)。離線努力量雖然不納入標準化目擊率之分析，但是若有目擊鯨豚，仍然是很重要的資料。航行時間為出港到進港總花費的時間，包含有效努力量和無效努力量。海上調查其航行船速保持在 6-9 節 (海浬/小時)，船隻將每 10 分鐘暫停，停船時即撈取表層海水並利用 YSI 30 鹽溫儀測量水表溫度、鹽度，並記錄環境因子資料。
5. 當遇見海豚時，記錄最初發現海豚的位置與角度、離船距離及船隻的角度，並視情形慢慢接近海豚群體，記錄接近點的經緯度位置，估算海豚群體隻數、觀察海豚行為，及蒐集相關環境因子資料，並填寫鯨豚目擊記錄表。此外，使用相機或攝影機記錄海豚影像，以建立個體辨識照片資料。如海豚未表現明顯的躲避行為，則持續跟隨並記錄該群海豚之行為與位置。若所跟蹤的海豚消失於視野且在 10 分鐘等待之內無再目擊，則返回航線繼續進行下一群之搜尋。

(二) 水下聲學監測

水下聲學監測初步規劃底碇式水下聲學紀錄器，搭配標準型水下麥克風，佈放在 5 個測站點位進行監測，如圖 1.5-2 所示。每一季執行 14 天的量測工作。此錄音設備的響應頻率範圍可以接收到低頻的風機運轉噪音、船舶噪音、風雨噪音、魚類叫聲，以及中高頻的海豚哨叫聲與回聲定位脈衝聲。

二、鳥類生態

(一) 陸域鳥類

於彰濱工業區崙尾區的海岸地帶，採用滿潮暫棲所計數法

(Sutherland, 1996) 進行。鳥類在退潮時，會散布於廣大的潮間帶泥灘地間覓食，觀測與記錄不易；而在漲潮時，鳥類會集結成群往海堤內或鄰近的內陸適宜的環境休息，此時記錄並評估數量較為容易。於調查範圍內沿既成道路或產業道路以緩慢步行速度配合雙筒望遠鏡進行調查，記錄沿途所目擊或聽見的鳥種及數量。除了辨識種類與計算數量外，並記錄鳥類的行為及其出現的棲地環境。

調查時必須配合中、大潮的潮水時間，在前後數天選擇晴朗的天氣，於滿潮前後 3 個小時內進行，此時潮間帶幾乎被潮水完全淹沒，鳥類往暫棲所移動，記錄族群數量較為準確。

(二) 雷達調查:

1. 海上鳥類雷達調查是目前國際上常應用於鳥類調查的方法，雷達調查相較於肉眼觀察，不因夜晚光線不足而縮限觀測距離，且發出的電磁波亦不會使鳥類飛行方式改變 (Bruderer et al., 1999)，因此對於利用夜間遷徙的鳥類來說，使用雷達觀察能補足肉眼觀察之不足，並且能提供大範圍的飛行路線、飛行高度與活動時間分佈等資訊。在雷達功率選擇上，雖高功率的雷達掃描範圍可以遠達 100 公里，但遠距離的鳥類目標卻無法反射足夠的雷達波，因此無法被調查雷達發現，故本工作使用低功率雷達於風場區域內偵測鳥類個體的活動。
2. 本工作調查規劃將雷達系統架設於船舶上，錨泊於風場範圍內適合處採定點 24 小時長時間鳥類雷達調查，記錄風場範圍內鳥類雷達回波。而本工作使用一組垂直雷達與水平雷達同時調查，藉由分析收集的鳥類雷達回波資訊數值，可了解風場範圍內不同季節鳥類飛行軌跡、主要飛行高度、飛行方向及全日活動時間分佈等資訊。
3. 本工作使用的雷達系統由弘益生態有限公司所開發，專用於鳥類調查的雷達系統，該系統的軟、硬體皆已根據鳥類

調查的需求而最佳化，設備規格依照 StUK4 (Aumüller et al., 2013) 的建議所設置。調查期間將雷達系統（水平和垂直雷達）安裝於船舶（圖 1.4-2），作業時於適合處進行持續監測，記錄雷達回波數值以判斷鳥類之飛行路徑及高度。本調查採用之雷達系統規格如表 1.4-1 所示。




圖 1.4-2 裝載於船上之雷達系統

表 1.4-1 雷達系統規格表

雷達頻段	X-band
功率	25 kW
天線長度	6 英尺
最大範圍	96 海里

4. 本計畫同時使用水平及垂直雷達進行掃描，於海上雷達調查完成後將雷達調查記錄之回波數據攜回，截取記錄到鳥類飛行時之回波資訊，由地理資訊系統（GIS）標示鳥類出現之座標資訊，計算該點飛行時之連續座標位置，並以圖層方式呈現於 GIS 系統中，再將所得資訊呈現於地圖上，以了解鳥類飛行路線和目標區域之關係，雷達回波圖

如圖 1.4-3 所示。同時將取得掃描範圍內目標的高度資訊，進行高度及活動時間等分析。藉由分析水平及垂直雷達所得之鳥類資訊，可了解鳥類飛行路徑、飛行高度、飛行方向及全日活動時間分佈等資訊。




圖 1.4-3 雷達回波圖說明

(三) 候鳥衛星繫放：

本工作規劃於彰濱工業區海岸適當地點，並選在漲潮期間鳥類經常停棲之場域設套索陷阱進行捕捉或選擇漲潮期間鳥類經常停棲之場域，利用腳套式繩圈或霧網進行捕捉，捕獲個體後將進行拍照、測量型值，並在其背部或腰部繫上衛星發報器現地野放。為降低衛星發報器對樣鳥的影響並確保追蹤過程之健康，限制個體配戴之發報器重量不得超過其體重的 5% (Cochran 1980; Caccamise and Hedin 1985)。當個體紀錄且配戴發報器完成後即現地野放並追蹤其衛星訊號。

透過執行候鳥衛星繫放可獲得受繫放鳥類之 GPS 座標及飛行方位等資訊，以圖層方式呈現於 GIS 系統中，再將所得資訊

呈現於地圖上，以了解鳥類飛行路線和目標區域之關係。由於 GPS 定位點海拔高度與實際高度有一定程度誤差值，故於繫放前衛星發報器需放置於已知海拔定點，獲得定位高度，藉以校正與實際高度之誤差。

本繫放工作將優先使用中國製 5.2 克(2G)與 6.4 克(4G)的 Debut MINI 衛星發報器(Druid, Inc.)如圖 1.4-4，該款發報器可提供 GPS 座標、飛行高度等參數，設定 1-2 小時定位一次，若發報器電力超過 4.0V 且目標鳥持續飛行下，會進入間隔 1-10 分鐘定位一次的模式，以獲取更詳細的資訊，其中 5.2 克的 Debut MINI 資料回傳方式是透過 2G 訊號，因此繫放後須等到追蹤個體飛至有 2G 訊號的地區，才會回傳資料，112 年 6 月起 Debut MINI 的 4G 通訊版本上市，在台期間即可獲得資料，將提升資料收取的成功率。此外，當捕獲鳥種體型許可，也會嘗試配戴更大的 10.5 克 Debut OMNI(3G)衛星發報器(Druid, Inc.)如圖 1.4-5，該款發報器則不受限於 2G 通訊地區，在台期間即可即時獲取定位資訊。後續資料分析將呈現每隻個體出入台灣海峽的時間、遷移路線與航高(公尺)。




圖 1.4-4 Debut MINI(2G、4G)太陽能衛星發報器



圖 1.4-5 Debut OMNI(3G)太陽能衛星發報器

三、環境物化調查(空氣品質、營建噪音)

本監測項目之檢測方法如表 1.4-2 所示，各類別均依據行政院環境部公告之最新檢測方法檢測。

表 1.4-2 環境物化調查檢測方法彙整表

類別	調查項目	檢驗方法
空氣品質	總懸浮微粒(TSP)	高量採樣法：NIEA A102.13A
	懸浮微粒(PM ₁₀)	貝他射線衰減法：NIEA A206.11C
	懸浮微粒(PM _{2.5})	手動採樣法：NIEA A205.11C
	二氧化硫(SO ₂)	紫外光螢光法：NIEA A416.14C
	氮氧化物(NO _x)	化學發光法：NIEA A417.13C
	一氧化碳(CO)	紅外光法：NIEA 421.13C
	臭氧(O ₃)	紫外光吸收法：NIEA A420.12C
	風向、風速	使用風向、風速計法
營建噪音	低頻 (20 Hz~200 Hz 量測 L _{eq})	NIEA P205.93C
	一般頻率 (20Hz~20kHz 量測 L _{eq} 及 L _{max})	NIEA P201.96C

四、陸域生態

(一) 陸域植物調查

1. 植物種類調查

收集計畫調查區域相關文獻作為參考，並配合現場採集工作進行全區維管束植物種類調查。

調查路線依可達性及植群形相差異主觀選定，並沿線進行植物標本採集及物種記錄，遇稀特有植物、具特殊價值植物或老樹另記錄其點位、生長現況及環境描述。

物種鑑定及名錄主要依據「Flora of Taiwan, 2nd edition」(Boufford *et al.*, 2003)、「臺灣種子植物科屬誌」(楊等, 2009)及「國立台灣大學生態學與演化生物學研究所, 2022」(國立台灣大學植物標本館, 2012)。物種屬性認定依照中央研究院生物多樣性研究中心的「臺灣物種名錄」(鍾等, 2022)，如有未記錄者，則參照「台灣野生植物資料庫」(行政院農業委員會特有生物研究保育中心, 2019)。入侵植物的認定依據「全球入侵種資料庫(中文版)」(行政院農業委員會林務局, 2022)。

稀有植物認定依據「文化資產保存法施行細則」(行政院農業委員會, 2022)指定的珍貴稀有植物及「植物生態評估技術規範」(行政院環境部, 2002)所附之臺灣地區稀特有植物名錄，另外參考「2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄」(臺灣植物紅皮書編輯委員會, 2017)所評估的結果。

調查範圍的受保護樹木標準依照行政院農業委員會令訂定的「森林以外之樹木受保護樹木認定標準」(行政院農業委員會, 2016)第二條及「彰化縣樹木保育自治條例」(彰化縣政府, 2008)的老樹資料。

2. 植被調查

針對現地植被環境進行分區，並選擇具代表性之植被進行定

性調查，並以其優勢物種或特徵物種作為代表性命名，報告描述時將依照不同植被的生長型分成森林及草生植被進行描述。

3. 植物樣區調查

(1) 樣區調查方法

利用航照影像得到初步的植被資訊後，並到現場進行勘查後，就調查範圍內之主要植被進行取樣調查，樣區之數目、大小及分佈均依實地狀況作決定。各植被類型取樣方法如：

A. 森林

對於天然林、次生林及人工林等不同的森林類型進行取樣調查，以 100 平方公尺（10 公尺×10 公尺）為取樣單位，調查樣方內胸高直徑（diameter at breast height, DBH）1 公分以上所有樹種樹幹之胸高直徑，以及林下地被層之植物種類及覆蓋度，並記錄樣區之海拔及座標等環境因子。對於森林之結構層次及種類組成，詳加描述，並製作植被剖面圖，以表示植物社會之形相及社會結構。

B. 草生地

選擇典型地區隨機設置樣區，以 4 平方公尺（2 公尺×2 公尺）為取樣單位。調查樣方中所有草本種類及其百分比覆蓋度，並記錄樣區之海拔及座標等環境因子。配合環境現況對所調查之草生地之種類組成及主要優勢種類詳加描述，並分析在無人為干擾下未來演替之可能趨勢。

(2) 優勢度分析

野外記錄之原始資料以 excel 等軟體建檔後，應計算及分析各植種之優勢組成，優勢度以重要值（IV）表示。

重要值以某種在各別樣區或所有樣區之總密度、底面積、材積、覆蓋度或組合值表示之。重要值顯示該種植物於當地植群中所佔有的角色，其值越大則重要程度愈高。

A. 木本植物之重要值

$$IV = (\text{相對密度} + \text{相對優勢度} + \text{相對頻度}) / 3$$

$$\text{相對密度} = (\text{某一種的密度} / \text{樣區總密度}) \times 100$$

$$\text{相對底面積} = (\text{某一種的底面積} / \text{樣區總底面積}) \times 100$$

底面積由 DBH 換算

$$\text{相對頻度} = (\text{某一種類出現之樣區數} / \text{總樣區數}) \times 100$$

B. 草本植物之重要值

$$IV = (\text{相對覆蓋度} + \text{相對頻度}) / 2$$

$$\text{相對覆蓋度} = (\text{某一種的覆蓋度} / \text{所有種總覆蓋度}) \times 100$$

$$\text{相對頻度} = (\text{某一種類出現之樣區數} / \text{總樣區數}) \times 100$$

(3) 歧異度分析 (α -diversity)

歧異度指數是以生物社會的豐富度 (species richness) 及均勻程度的組合所表示。此處以 S、Simpson、Shannon-Wiener、N1、N2 及 E5 六種指數 (Ludwig and Reynolds, 1988) 表示之。木本植物以株數計算，草本植物則以覆蓋度計算。另有估計出現頻度，即某植物出現之樣區數除以總樣區數。

A. S 代表調查範圍內所有植物種數。

$$B. \lambda = \sum \left(\frac{n_i}{N} \right)^2$$

λ 為 Simpson 指數， n_i/N 為機率，表示在一樣區內同

時選出兩株，其屬於同一種的機率是多少。其最大值是 1，表示此樣區內只有一種。如果優勢度集中於少數種時， λ 值愈高。

$$H' = -\sum \left(\left(\frac{n_i}{N} \right) \ln \left(\frac{n_i}{N} \right) \right)$$

木本： n_i ：某種個體數 N ：所有種個體數

草本： n_i ：某種覆蓋度 N ：所有種覆蓋度

H' 為 Shannon-Wiener 指數，此指數受種數及個體數（覆蓋度）影響，種數愈多，種間的個體分佈愈平均，則值愈高。但相對的，較無法表現出稀有種。

$$N_1 = e^{H'} \quad H' \text{ 為 Shannon-Wiener 指數}$$

此指數指示植物社會中具優勢的種數。

$$N_2 = \frac{1}{\lambda} \quad \lambda \text{ 為 Simpson 指數}$$

此指數指示植物社會中最具優勢的種數。

$$E5 = \frac{\left[\left(\frac{1}{\lambda} \right) - 1 \right]}{e^{H'} - 1}$$

此指數可以明顯的指示出植物社會組成的均勻程度。指數愈高，則組成愈均勻；反之，如果此社會只有一種時，指數為 0。

(二) 陸域動物調查

1. 哺乳類

哺乳類主要調查方式分別為穿越線（或沿線）調查法與誘捕法，穿越線（或沿線）調查是配合鳥類調查時段，以緩慢的步行速度配合望遠鏡和強力探照燈（夜間使用）目視搜尋記錄，同時留意路面遭輾斃之死屍殘骸和活動跡象（足印、食

痕、排遺及窩穴等) 作為判斷物種出現的依據。誘捕法則沿鳥類調查路線，選擇草生地與樹林地等較為自然之處，以薛氏捕鼠器或臺製松鼠籠等進行小型鼠類誘捕，捕鼠籠內置餌料誘食，於傍晚施放並於隔日清晨巡視誘捕籠，同時進行餌料更換的工作，共設置30個鼠籠（每個點為5個鼠籠），持續捕捉4天3夜，合計共90個捕捉夜。

蝙蝠調查使用超音波偵測器進行，於黃昏及夜間沿線調查時使用，以錄音方式記錄蝙蝠所發出之超音波，如有目擊到蝙蝠飛行則記錄蝙蝠數量，並將錄音檔攜回後以電腦軟體分析聲音特徵輔助判釋物種。

哺乳類鑑定主要參考「台灣哺乳動物」（祁，2008）、「臺灣地區保育類野生動物圖鑑」（馮等，2010）、「臺灣蝙蝠圖鑑」（鄭等，2010）及「臺灣食肉目野生動物辨識手冊」（鄭等，2015）等著作為鑑定依據。

2. 鳥類

鳥類調查方式主要是採穿越線（或沿線）調查法及定點調查法，穿越線（或沿線）調查法是沿既成道路或小徑以緩慢步行速度配合雙筒望遠鏡進行調查，記錄沿途所目擊或聽見的鳥種及數量，定點觀察法則於所選定的每一樣點停留6分鐘，記錄所目擊或聽見的鳥種及數量，密林草叢間活動鳥種則配合鳴叫聲進行種類辨識和數量的估算。由於不同鳥類的活動時間並不一致，為求調查資料之完整，調查分成白天與夜間兩個時段，白天主要配合一般鳥類活動高峰，於日出後三小時內（時段為6:00~9:00）進行，夜間調查（時段為18:30~20:30）則是在入夜後進行。

鳥類鑑定主要參考「台灣鳥類全圖鑑」（方，2010）、「猛禽觀察圖鑑」（林，2020）、「台灣野鳥圖鑑：水鳥篇-增訂版」（廖，2022）及「台灣野鳥圖鑑：陸鳥篇-增訂版」（廖，2021）。

3. 爬蟲類

爬蟲類是綜合穿越線調查法（或沿線）與捕捉調查法，穿越線調查法（或沿線）是配合鳥類調查路線與步行進行，在一定時間內記下眼睛看到的爬蟲類動物種類與數目。而捕捉調查法則以徒手翻找環境中的遮蔽物（石頭、木頭、樹皮、廢輪胎及廢傢俱等），並輔助手電筒及耙子等工具檢視洞穴或腐葉泥土，記錄看到與捕捉到的爬蟲類動物後原地釋回。由於不同種類有其特定的活動時間，為避免遺漏所有可能物種，調查時間區分成白天及夜間等兩時段進行。日間調查時間則尋找個體及活動痕跡（蛇蛻及路死個體）；夜間則以手電筒照射之方式進行調查。

爬蟲類鑑定主要參考「台灣兩棲爬行類圖鑑」（向等，2009）及「台灣蜥蜴自然誌」（向，2008）等著作為鑑定依據。

4. 兩棲類

綜合沿線調查與繁殖地調查等兩種方法，沿線調查法是配合鳥類調查路線與步行進行，記錄沿途目擊或聽見的兩棲類。而繁殖地調查法則是在兩棲類聚集繁殖的蓄水池、排水溝或積水處等候記錄。由於不同種類有其特定的活動時間，為避免遺漏所有可能物種，調查時間區分成白天及夜間等兩時段進行。日間調查時間則尋找個體及活動痕跡（路死個體），同時徒手隨機翻找環境中可能提供躲藏隱蔽之掩蓋場所（石塊、倒木及石縫）。夜間則以手電筒照射之方式進行調查。

兩棲類鑑定主要參考「台灣兩棲爬行類圖鑑」（向等，2009）及「台灣蛙類與蝌蚪圖鑑」（楊等，2019）等著作為鑑定依據。

5. 蝶類

蝶類主要是利用目視遇測法及網捕法進行調查。在調查範圍內記錄目擊所出現的蝶種。若因飛行快速而無法準確判定時，則以網捕法捕捉進行鑑定後原地釋回。

蝶類鑑定主要參考「臺灣蝴蝶圖鑑（上）弄蝶、鳳蝶、粉蝶（修訂版）」（徐，2022）、「臺灣蝴蝶圖鑑（中）灰蝶」（徐，2013a）、「臺灣蝴蝶圖鑑（下）蛺蝶」（徐，2013b）、「臺灣蝴蝶手繪辨識圖鑑」（陳，2016）及「台灣疑難種蝴蝶辨識手冊」（黃等，2010）等著作為鑑定依據。

6. 蜻蜓類

蜻蜓之調查主要利用目視遇測法及網捕法進行調查，在調查範圍內，記錄空中飛行、停棲於植物或石頭上等環境出現之蜻蛉種類，若因飛行快速而無法準確判定時，則以網捕法捕捉進行鑑定後原地釋回。

蜻蜓類鑑定主要參考「臺灣 120 種蜻蛉圖鑑」（曹，2005）及「臺灣蜻蛉目昆蟲檢索圖鑑」（林等，2016）等著作為鑑定依據。

(三) 多樣性指數分析

將現場調查所得資料整理與建檔，針對種類、數量、歧異度、分佈、優勢種、保育種、珍貴稀有種及候鳥等進行分析，並適時提供相關物種之圖片，以增進閱讀報告之易讀性，並依據其存在範圍、出現種類及頻率，嘗試選擇其指標生物，以供分析比較；多樣性指數分析則採用：

1. Shannon-Wiener 歧異度指數 H'

$$H' = -\sum P_i \ln P_i = -\sum (n_i/N) \times \ln (n_i/N)$$

P_i ：為各群聚中第 i 種物種所佔的數量百分比。

n_i ：某物種個體數。

N ：所有物種個體數。

H' 指數可綜合反映一群聚內生物種類之豐富程度及個體數在種間分配是否均勻。此指數越大時表示此地群落之物種越豐富，即各物種個體數越多越均勻，代表此群落歧異度較大，若此地群落只由一物種組成則 H' 值為 0.00。通常成熟穩定之生態系擁有較高的歧異度，且高歧異度對生態系的平衡有利，

因此藉由歧異度指數的分析，可以得知調查區域是否為穩定成熟之生態系。

2. Pielou 均勻度指數 J'

$$J' = H' / \ln S$$

H' ：Shannon-Wiener 指數

S ：各群聚中所記錄到之物種數

J' 值越大，則個體數在種間分配越均勻。

五、陸域施工考古監看

(一) 監看時間及頻率

考古監看依據工程單位提供之設計圖及工期表針對施工隨行監看。監看內容主要係針對進行下挖施工中監看調查。

(二) 資料整理與分析

在監看範圍內檢視挖掘之土方或地層斷面土質土色變化，若發現遺物，將針對採集出土遺物，進行標本之清洗、編號、篩選、分類、計測、分析、拍照等整理工作，並據遺物出土之地表調查結果，繪製可能之遺址分布圖、地層斷面圖，並就採集之器物研判完整之器型，並選擇部分器物、標本進行年代分析或陶片、土壤分析，以確認其分布範圍及文化內涵。

(三) 撰寫監看報告

根據監看結果、地表調查及地表標本採集分析，說明計畫基地區域內之現況，製作成電子檔，由計畫主持人或當次監看人員簽署。並於每季提送監看報告送委託單位於文化資產主管相關機關備查。

(四) 發現疑似文化資產之處理方式

考古監看中若發現具古蹟、歷史建築價值之建造物、疑似考古遺址，皆應依《文化資產保存法》第 33、57、77、88 條要求施工單位暫停工程，並報主管機關處理。

1.5 監測位址

本計畫監測位址如圖 1.5-1~8 所示。




圖 1.5-1 鯨豚測線圖




圖 1.5-2 水下聲學監測點位圖



圖 1.5-3 候鳥繫放執行捕抓繫放範圍及風場相對位置圖




圖 1.5-4 雷達調查定點及風場相對位置圖




圖 1.5-5 陸域物化監測位置示意圖




圖 1.5-6 陸域生態調查範圍示意圖



圖例

— 海岸鳥調查範圍



圖 1.5-7 陸域鳥類調查範圍示意圖



圖 1.5-8 陸域施工考古監看範圍示意圖

1.6 品保／品保作業措施概要

為確保調查工作的數據品質及執行成果達到準確性及完整性，故定訂本品保品管措施，做為品質控管及保證的執行要點，其作業流程如圖 1.6-1 所示。




圖 1.6-1 作業流程圖

1.6.1 鯨豚生態

一、一般視覺監測

(一) 監測作業

1. 監測前準備

- (1) 出發前須確實了解調查相關事宜。
- (2) 隨時注意天候海象預報，安排監測作業期程並預先做好準備。
- (3) 定期保養裝備器材，確保出海監測時裝備器材之妥善狀況。每次作業前，均需確認各項裝備器材之正常使用。
- (4) 依期程安排調查路線，出發前領隊即和船長確認當次調查路線。

2. 監測作業進行

- (1) 填報出港紀錄表並拍照留存數位檔案備查。
- (2) 調查進行中，領隊隨時和船長確認當次調查路線有無偏移，確保當次調查之有效性。
- (3) 各人員明確依照分工進行調查作業，並依據監測作業準則執行工作。
- (4) 正確使用各項裝備器材，電子儀器均須備妥備用電池。
- (5) 詳實記錄監測路線上環境及調查人員作業之影像，作為現場實際狀況之輔助依據。

3. 監測完成後

- (1) 下船前清點裝備器材之數量，確認無遺漏在船上。返回公司後立即清潔及保養各裝備器材，如有耗損狀況需通報裝備管理者。
- (2) 確認各資料原始記錄表單數量無誤並檢查填寫資訊之完整性，於作業結束後一週內完成資料輸入。
- (3) 領隊召集當次調查人員進行工作會議，針對當次作業進行討論，記錄各項問題及狀況並回報公司主管。

(二) 資料彙整及報告撰寫

1. 原始記錄表單彙整後妥善留存管理，同時掃描成數位檔保留備份。檢視記錄資料是否有明顯的偏差，若有的話立即向當次調查人員查核，確認該記錄之正確性。
2. 資料輸入後，核對原始記錄表單，檢視是否有誤植疏漏並立即修正。
3. 依據調查記錄撰寫報告，重複檢查資料及內容是否正確。

二、水下聲學監測

(一) 監測前準備

1. 出發前應確實了解調查相關事宜。
2. 調查人員安排，嚴格禁止單人調查作業，避免緊急狀況發生時無第二人予以協助。
3. 調查前一日，需確認調查地點天候狀況，若天候狀況不佳，則需更延後調查日期，確保調查人員安全及減少因特殊事件發生。
4. 每次調查前均須做裝備檢修，並備妥備用裝備。裝備若遇損毀得於調查前進行檢修或添購完畢使得調查。

(二) 資料品質查核

1. 所量測資料是否完全涵蓋需量測之時間。
2. 作業完成後，立即填報記錄表單。
3. 電磁記錄之樣品須於作業後，需立即檢測資料完整性。
4. 完成後，應以規範之容器儲存記錄表單及器材。

(三) 整體品質查核

1. 資料分析
 - (1) 分析人員依天候檢核作業參數合理性。
 - (2) 以調查單位開發之專屬程式解譯完整電磁資訊。
 - (3) 逐時分析電磁資訊，記錄各點時間、座標，風速風向等資訊。
 - (4) 建立分析資料表。
2. 複核資料：分析人員須以電磁資料，比對作業人員手稿記錄，予以參照核對確認。

(四) 數據分析及撰寫

1. 資料整理與統計分析
 - (1) 資料歸檔時，資料格式(含單位)均須一致，便利後續數據

分析、報表製作及減少資料勘誤。

(2) 資料整理後，須優先篩選出整體資料中最具差異性之部分，並對差異再進行一次性的檢查，確保資料無誤後，加以標註，以便後續報告撰寫者之判讀。

(3) 所有資料均須經過兩人以上檢查驗證並簽核，且所有資料檔案均須留有兩份以上備檔。

2. 報告撰寫

(1) 報告撰寫需特別注意用字遣詞、格式一致，避免前後文意不順暢。

(2) 報告撰寫完畢後除須自行檢查外，需再交由兩人以上檢查簽核，避免因人為盲點造成對報告內容的勘誤。

1.6.2 鳥類生態

一、陸域鳥類

為確保陸域鳥類調查各項工作的數據品質及執行成果是否達到準確性及完整性，故擬定陸域鳥類調查品保品管規劃書，做為品質控管及保證的執行要點，其作業流程參考圖 1.6.2-1，作業要點如下文。

(一) 人員訓練

1. 所有調查作業人員，均具有相關調查作業經驗或生態相關科系畢業。
2. 公司內部定期舉辦工作安全講習，培養工作人員對工作環境的安全意識。
3. 公司內部定期舉辦教育訓練，培養調查作業人員專業素養。




圖 1.6.2-1 採樣分析標準流程圖

(二) 調查前準備

1. 調查前須確實了解調查相關事宜（工作計畫書與 HSE 計畫書）。
2. 調查人員安排，嚴格禁止單人調查作業，避免緊急狀況發生時無第二人予以協助。
3. 調查前一日，需確認調查地點天候種況，若天候狀況不佳，則需更延後調查日期，確保調查人員安全及減少因特殊事件發生。
4. 每次調查前均須做裝備檢修，並備妥備用裝備。裝備若遇損毀得於調查前進行檢修或添購完畢使得調查。

(三) 現場品質查核

現場工作記錄的完整性是日後追蹤工作最重要之依據，特別

是在監測數值出現異常時，經常需要依據當時對調查條件、氣象條件等記錄或照片來研判，因此本團隊的稽核小組將會嚴格的檢視各分項工作小組在現場所保留的記錄，並詳實予以評估。具體內容如下：

1. 每到調查區域均須以相機記錄下環境狀況。如遇特殊狀況，需特別記錄描述並向相關承案人員報備。
2. 對現場使用之調查儀器與調查工具是否做好檢修及校正之工作。
3. 裝備使用前，均再快速檢查裝備，若遇損毀得馬上以備用裝備做更換。
4. 現場調查工作執行時，是否依相關規範進行調查工作，避免因調查人員因素而產生調查結果之誤差。
5. 是否完全依照本工作計畫所佈置之穿越線進行。
6. 是否妥善記錄現場之環境狀況，如有異常或變異情況應確實記錄，以對未來資料監測產生的可能變異，進行初步現場的瞭解。
7. 陸域動物調查，均於現場記錄拍照後原地釋回，若無法馬上鑑種者，則拍照記錄其分類特徵。待回去後再進行鑑種。

(四) 蒐集資料品質查核

蒐集資料包括本計畫地區歷年之調查資料，此等資料須直接就資料監測之結果進行彙整，並完成報告之編輯，以下則對此部分所應執行之品質查核做說明。

1. 所蒐集資料是否完全或有部分殘缺。
2. 須認定所得資料是否為原始資料，如為次級資料(經分析、整理後之資料)，則就次級資料之內容再研究是否有再進一

步蒐集原始資料之必要。

3. 蒐集資料文件中是否有缺頁或印刷不清之情形發生。

(五) 整體品質查核

整體品質查核的項目包含新資料的整理及歷年資料的整理，查核的內容包括如下。

1. 資料彙整過程中，若需將原資料轉錄至其它文件中，是否有人為的疏失，而使轉錄的資料發生偏差。
2. 資料整理時，對各工作之監測項目是否採用相同之計量單位。
3. 對資料整理的內容亦審慎檢查是否有缺項、遺漏或忘記登載之處。
4. 對於整理後之資料，應初步檢查並選出其中與整體具有高差異性的資料。
5. 現場採樣之紙本記錄，須交由相關人員彙整，並妥善管理保存，如資料有殘缺誤植，則得需迅速向作業人員加以確認修正並簽核。
6. 資料歸檔時，資料格式（含單位）均須一致，便利後續數據分析、報表製作及減少資料勘誤。
7. 資料整理後，須優先篩選出整體資料中最具差異性之部分，並對差異再進行一次性的檢查，確保資料無誤後，加以標註，以便後續報告撰寫者之判讀。
8. 所有資料均須經過兩人以上檢查驗證並簽核，且所有資料檔案均須留有兩份以上備檔。
9. 報告撰寫完畢後除須自行檢查外，需再交由兩人以上檢查

簽核，避免因人為盲點造成對報告內容的勘誤。

二、雷達調查

(一) 儀器保管

1. 電子儀器設備操作人員均需完成弘益公司內部完整訓練，且經考核通過，才能執行調查。
2. 每月均需仔細檢查裝備一次，確保裝備使用良率。
3. 每次出差前均須做裝備檢修，並備妥備用裝備。裝備若遇損毀得於出差前進行檢修或添購完畢始得出差。
4. 裝備使用前，均需再快速檢查裝備，若遇損毀得馬上以備用裝備做更換。
5. 所有船載設備，均須特別注意海水及鹽分腐蝕問題，避免電子設備故障及使用年限縮短。

(二) 現場調查作業

1. 現場調查作業
 - (1) 調查前確實確認作業期間天候狀況。
 - (2) 作業人員行程編排。
 - (3) 作業器材檢核與確認。
 - (4) 記錄表單與電磁記錄設備確認。
2. 資料傳遞
 - (1) 作業人員返回實驗室後，分析人員應立即與其交接記錄資料。
 - (2) 移動式電磁記錄應儘速存入指定之磁碟陣列。
 - (3) 紙本資訊則予以掃描歸檔保存。

3. 資料分析

- (1) 分析人員依天候檢核作業參數合理性。
- (2) 以調查單位開發之專屬程式解譯完整電磁資訊。
- (3) 逐時分析電磁資訊，記錄各點時間、座標，風速風向等資訊。
- (4) 建立分析資料表。

4. 複核資料：分析人員須以電磁資料，比對作業人員手稿記錄，予以參照核對確認。

(三) 數據分析及報告撰寫

1. 資料整理與統計分析

- (1) 資料歸檔時，資料格式(含單位)均須一致，便利後續數據分析、報表製作及減少資料勘誤。
- (2) 資料整理後，須優先篩選出整體資料中最具差異性之部分，並對差異再進行一次性的檢查，確保資料無誤後，加以標註，以便後續報告撰寫者之判讀。
- (3) 所有資料均須經過兩人以上檢查驗證並簽核，且所有資料檔案均須留有兩份以上備檔。

2. 報告撰寫

- (1) 報告撰寫需特別注意用字遣詞、格式一致，避免前後文意不順暢。
- (2) 報告撰寫完畢後除須自行檢查外，需再交由兩人以上檢查簽核，避免因人為盲點造成對報告內容的勘誤。

三、候鳥衛星繫放

(一) 發報器使用與保管

1. 取得發報器後，確認重量是否未超過標準重量 $\pm 5\%$ 。
2. 取得發報器後確認定位之海拔高度與水平位置均在平均誤

差範圍內。

3. 按時日曬充電確保電力無虞，並開機確認傳訊與定位功能正常。

(二) 現場調查作業

1. 現場捕捉繫放作業

- (1) 繫放前確認作業期間天候潮汐狀況。
- (2) 繫放前確認各項器材數量與功能。
- (3) 繫放前確認發報器電力與定位。

2. 鳥類繫放作業

限制樣鳥配戴之發報器重量不得超過其重量的 5%。

(三) 資料整理及報告撰寫

1. 資料整理

資料於雲端下載後，去除空號定位值，再進行各項分析。

2. 報告撰寫

- (1) 報告撰寫需特別注意圖表號、鳥隻名稱、日期等細節，是否前後一致。
- (2) 報告撰寫完畢進行至少三次複查，並由另一人協助至少一次複查，避免因人為盲點造成報告內容的勘誤。

1.6.3 物化分析

一、現場採樣之品保/品管

為使品保/品管能有效落實，因此在監測進行同時，除要求採樣人員遵照相關注意事項外(表 1.6.3-1 至 1.6.3-3)，並將進行現場品質評價，內容如下：

- (一) 量測前對現場使用之儀器設備是否做好檢修及校正工作。
- (二) 現場採樣、測量及調查工作執行時，是否正確使用儀器，避免

因使用不當所產生之誤差。

(三) 採樣、測量或調查之點，其位置之選擇，是否完全依照本監測工作計畫所佈置之位置點進行監測。

(四) 是否妥善記錄現場之環境狀況或變異，以求未來能正確解釋該數據代表之意義。

表 1.6.3-1 空氣品質採樣至運輸過程中注意事項

採樣程序	目的	注意事項
現場記錄	了解採樣當天現場一些可能造成之干擾	必須將氣象資料，環境異常因子詳加記載
穩定/校正	確保分析所得之數據十分具有代表性	使用儀器前必須先經過標準氣體校正，及零點校正使正確值至±3%
採樣	採樣時必須先行開機運轉，避免本身機件之誤差	使用測定前預先開機運轉至流量穩定，方可測定 24 小時之值
過濾/保存	使測定物質之干擾減至最低，並注意現場收集之採樣介質之完整性，避免造成分析上之誤差	例如使用 Tedlar 採氣袋收集時，須防止洩漏及落塵筒之水分補充。其他除硫醇類，臭味及落塵量外，均於現場直接測定
現場測定	樣品在運送時容易變質之項目，盡量在現場測定	現場測定項目包括：懸浮微粒、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、風速及風向等
空白樣品	為確保分析結果之正確性，攜回實驗室分析者，應有備品，且每次均有一組空白樣品	運送空白：實驗室準備採樣瓶的同時，以一只採樣瓶裝滿經蒸餾及去離子之純水隨同其他採樣瓶運送至採樣地點 野外空白：實驗室準備採樣瓶的同時，以一只採樣瓶裝滿經蒸餾及去離子之純水，攜至現場，打開後，再封閉攜回分析
儲存/運送	避免樣品因儲存時間過久或運送不當，造成品質變化	需遵照環境部所公告之樣品保存方法加以運送及保存，並注意密封時之完整性

表 1.6.3-2 噪音監測過程中注意事項

採樣程序	目的	注意事項
器材清點	確保器材設備之完整性	填寫儀器採樣清單
確定音位校正有效期	保證監測數據標準可追溯性	檢查儀器校正資料
現場架設	完成設備組裝	1. 依現勘選定之測點進行監測，並依噪音之規定來架設 2. 接上電源將噪音計調整高度至 1.2~1.5m
電子式校正	確保器材之穩定性	利用及內設電子訊號，由內部資料蒐集系統讀取反應值，讀值應在 94±0.7dB 或 114±0.7dB
儀器設定	依計畫需求設定資料輸出模式	噪音採用記憶卡記錄量測值，並經資料處理軟體統計量測結果
現場測定	確定資料正常運作蒐集	24 小時監測應自零時開始

二、分析工作之品保/品管

樣品之採集、保存及實驗室分析等步驟大多有一標準程序(如圖 1.6.3-1)，並透過檢驗室之品保/品管流程，求得完整、精確，並具代表性之分析結果。其詳細內容如下：

- (一) 是否訂有實驗室樣品前處理、儲存及分析之程序。
- (二) 每個樣品是否詳細登入採樣日期、編號及所需檢測項目。
- (三) 樣品之檢驗分析，是否採用合乎標準方法進行檢測(或說明方法源)。
- (四) 檢測人員是否完全依照規定之檢驗程序進行檢驗。
- (五) 檢測結果之轉錄程序，是否因人為的疏失，而使結果產生偏差。




圖 1.6.3-1 採樣分析標準流程圖

三、 監測數據品保目標

為了確保檢測數據之品質，常以準確性、精密性、完整性、代表性及比較性五項數據品質指標（Data Quality Indicator）來對數據品質目標作定量和定性的描述，並進而訂出數據品質目標值。本計畫監測項目之品保目標值如表 1.6.3-3 所示。

表 1.6.3-3 環境監測數據品質目標值

類別	項目	檢驗方法	精密度 (相對差異百分比)	準確性分析		完整性	偵測極限
				品管 樣品	添加 樣品		
空氣品質	TSP	NIEA A102.13A	—	—	—	100%	0.5mg
	PM ₁₀	NIEA A206.11C	—	—	—	100%	10µg/m ³
	PM _{2.5}	NIEA A205.11C	—	—	—	90%	2µg/m ³
	SO ₂	NIEA A416.14C	10%	—	—	100%	1.0ppb
	NO _x	NIEA A417.13C	10%	—	—	100%	1.0ppb
	CO	NIEA A421.13C	10%	—	—	100%	0.1ppm
	O ₃	NIEA A420.12C	10%	—	—	100%	2ppb
	風向	—	—	—	—	100%	—
	風速	—	—	—	—	100%	—
噪音	低頻 (20 Hz~ 200 Hz 量測 L _{eq})	NIEA P201.96C	±0.7 dB	±0.7 dB		100 %	30 dB
	一般頻率 (20Hz~ 20kHz 量測 L _{eq} 及 L _{max})	NIEA P205.93C	±0.7 dB	±0.7 dB		100 %	20 dB

註：偵測極限為儀器偵測極限值，本表偵測極限為品保目標值，實際偵測極限將以品保報告書為主，另亦於各項目監測結果說明。

四、 數據處理原則

監測數據有效測值之定義為每日至少測 21 小時，測值計算方式則有日平均值、24 小時值及 8 小時值，噪音則採能量平均值。

1.6.4 陸域生態

陸域生態調查的品保品管作業，是確保調查中各項工作的數據品質目標及執行成果達到準確性及完整性的查核依據，因此為確保計畫執行得到預期成效，應建立計畫品質保證及管理計畫，做為品質控管及保證的執行要點。本調查之工作內容可分為採樣及資料分析整理二大部份，每個執行單項按其專業分擔部份工作，因此如何監督各分項工作切實執行品保計畫，引導整體工作按既定程序與步驟施行，更為重要。為此，本工作團隊乃擬定一總體品質管制計畫，以本團隊成立的總體品保稽查小組對每個分項工作小組品保工作的適應性及效率施予查核，以期在必要之處引進正確的措施，確保品保目標之達成，總體品質保證體系流程參考如圖 1.6.4-1。




圖 1.6.4-1 採樣分析標準流程圖

一、出差前準備

- (一) 調查前須確實了解調查相關事宜（包括點位確認、工作項目確認）。
- (二) 出差人員安排，嚴格禁止單人調查作業，避免緊急狀況發生時無第二人予以協助。
- (三) 出差前一日，需確認調查地點天候狀況，若天候狀況不佳，則需更延後調查日期，確保調查人員安全及減少因特殊事件發生。
- (四) 每次出差前均須做裝備檢修，並備妥備用裝備。裝備若遇損毀得於調查前進行檢修或添購完畢使得出差。

二、現場品質查核

現場工作記錄的完整性是日後追蹤工作最重要之依據，特別是在監測數值出現異常時，經常需要依據當時對調查條件、氣象條件等記錄或照片來研判，因此本團隊的稽核小組將會嚴格的檢視各分項工作小組在現場所保留的記錄，並詳實予以評估。具體內容如下：

- (一) 每到採樣點均須填寫測站記錄，並以相機記錄下環境狀況。如遇特殊狀況，需特別記錄描述並向相關承案人員報備。
- (二) 對現場使用之調查儀器與調查工具是否做好檢修及校正之工作。
裝備使用前，均再快速檢查裝備，若遇損毀得馬上以備用裝備做更換。
- (三) 現場採樣工作執行時，是否依相關規範進行調查工作，避免因調查人員因素而產生調查結果之誤差。
- (四) 採樣點其位置之選擇，是否完全依照本監測工作計畫所佈置之位置點進行監測。
- (五) 是否妥善記錄現場之環境狀況，如有異常或變異情況應確實記錄，以對未來資料監測產生的可能變異，進行初步現場的瞭解。
- (六) 陸域動物調查，均於現場記錄拍照後原地釋回，若無法馬上鑑種者，則拍照記錄其分類特徵。待回去後再進行鑑種。

二、蒐集資料品質查核

蒐集資料包括本計畫地區歷年之調查資料，此等資料須直接就資料監測之結果進行彙整，並完成報告之編輯，以下則對此部分所應執行之品質查核做說明。

- (一) 所蒐集資料是否完全或有部分殘缺。
- (二) 須認定所得資料是否為原始資料，如為次級資料(經分析、整理後之資料)，則就次級資料之內容再研究是否有再進一步蒐集原始資料之必要。
- (三) 蒐集資料文件中是否有缺頁或印刷不清之情形發生。

三、整體品質查核

整體品質查核的項目包含新資料的整理及歷年資料的整理，查核的內容包括如下。

- (一) 資料彙整過程中，若需將原資料轉錄至其它文件中，是否有人為的疏失，而使轉錄的資料發生偏差。
- (二) 資料整理時，對各工作之監測項目是否採用相同之計量單位。
- (三) 對資料整理的內容亦審慎檢查是否有缺項、遺漏或忘記登載之處。
- (四) 對於整理後之資料，應初步檢查並選出其中與整體具有高差異性的資料。
- (五) 現場採樣之紙本記錄，須交由相關人員彙整，並妥善管理保存，如資料有殘缺誤植，則得需迅速向作業人員加以確認修正並簽核。
- (六) 資料歸檔時，資料格式(含單位)均須一致，便利後續數據分析、報表製作及減少資料勘誤。
- (七) 資料整理後，須優先篩選出整體資料中最具差異性之部分，並對差異再進行一次性的檢查，確保資料無誤後，加以標註，以便後續報告撰寫者之判讀。
- (八) 所有資料均須經過兩人以上檢查驗證並簽核，且所有資料檔案均

須留有兩份以上備檔。

(九)報告撰寫完畢後除須自行檢查外，需再交由兩人以上檢查簽核，避免因人為盲點造成對報告內容的勘誤。

1.6.5 陸域施工考古監看

一、考古監看人員

依考古遺址監管保護辦法與文化資產保存法施行細則規定，為減少開發工程對於考古遺址之破壞，考古監看人員必須具備考古遺址地層、現象和出土遺物之判讀技術與應用，作為確保文化資產保存相關法規之正確執行，作業要點如下文。

(一)人員資格

參考《考古遺址發掘資格條件審查辦法》第 8 條規定，應備以下資格之一：

1. 累積五年以上考古遺址發掘相關工作實務經驗。
2. 具有考古學系、人類學系學士學位或修畢相關學位學程，累積三年以上考古遺址發掘相關工作實務經驗。
3. 具有考古學系、人類學系碩士以上學位或修畢相關學位學程。

(二)考古監看工作

1. 得針對施工作業相關人員，進行考古監看任務說明。
2. 監看前裝備準備，人員應配戴安全裝備，基本包括安全帽、反光背心、安全鞋、雨鞋；其他如安全手套、護目鏡、耳罩等，得依現場情況選擇配戴。
3. 監看前器材準備，考古標竿、箱尺、利蒙尺、小平鏟、字牌、PC 夾鏈袋、或小鋤頭、圓鍬、相機。上列器材得依現場情況選擇使用。
4. 工作前須確實了解監看區域相關事宜，應確實聯繫需求者，

確認監看地點、施工類型、開挖深度、作業方式等。

5. 工作前一日，需確認監看地點天候狀況，若天候狀況不佳，則需與現場施工人員協調，確保監看人員安全及減少特殊事件發生。

(三) 現場工作日誌

現場工作記錄的完整性是日後追蹤工作最重要之依據，特別是在監測地層出現異常時，經常需要依據當時對調查條件、氣象條件等記錄或照片來研判。具體內容如下：

1. 監看人員均須以相機記錄下環境狀況。如遇特殊狀況，需特別記錄描述並向相關承案人員報備。
2. 現場調查工作執行時，是否依相關規範進行調查工作，避免因調查人員因素而產生調查結果之誤差。
3. 監看記錄、報告內容，應依據實際監看情況進行撰寫、檢查，同時由相關人員確認並簽署具名。

(四) 整體品質維護

1. 監看人員應確實依專業及法令規定，執行監看任務。
2. 需嚴格遵守監看地點相關工安規定。
3. 現場採樣之紙本記錄，須交由相關人員彙整，並妥善管理保存，如資料有殘缺誤植，則得需迅速向作業人員加以確認修正並簽核。

二、 監看中發現遺物標本

監看中採集之遺物標本，應依考古方式進行初步整理，並製作清單。依《文化資產保存法》第 53 條規定，將上述遺物、清冊，送主管機關指定機關(構)保管。

第二章

監測結果數據分析

第二章 監測結果數據分析

2.1 候鳥衛星繫放

本計畫自 110 年於彰濱工業區海岸執行鳥類(冬候鳥)繫放及衛星追蹤工作，統計至本季共完成 18 隻次候鳥衛星繫放作業。本計畫於 112 年第一季增加候鳥追蹤樣本數，共 5 隻黃足鵠，112 年第三季增加繫放 1 隻太平洋金斑鴿，本季新增繫放 2 隻太平洋金斑鴿，本季持續追蹤之樣本數共 4 隻，皆為太平洋金斑鴿(編號 7097、0C07、0C05 及 0C01)。

本季衛星追蹤候鳥與追蹤現況如表 2.1-1，以下就各繫放鳥類追蹤結果說明如下：

表 2.1-1 本季衛星追蹤候鳥與追蹤現況

鳥種	發報器編號	繫放日期	追蹤現況
太平洋金斑鴿	7097	111.01.02	傳訊至 112 年 6 月 1 日後，未再傳訊
太平洋金斑鴿	0C07	112.10.18	追蹤至 112 年 10 月 19 日於永興魚塢區斷訊，研究人員至當地搜尋未發現該個體或發報器
太平洋金斑鴿	0C05	113.02.25	目前活動於彰化沿海地區
太平洋金斑鴿	0C01	113.02.28	目前活動於彰化沿海地區

註：依據過去執行經驗，曾在斷訊後 6 個月後仍有收到訊號，因此一般在斷訊後會持續追蹤 6 個月確認是否還會有訊號回傳。

一、太平洋金斑鵒(發報器編號：7097)

於 111 年 1 月 2 日繫放，依據衛星訊號定位追蹤結果，111 年 4 月 24 日 22:00 左右於彰濱工業區一帶出海。該個體的出海路徑並未通過本計畫風場，最近距離為 12.8 公里(圖 2.1-1)，在台灣海峽的定位點有 5 個，平均飛行海拔高度為 1174.3 公尺，僅在甫出海時有一定位點海拔高度位於風機葉片高度範圍，其餘皆高於風機(圖 2.1-2 及表 2.1-2)。據此追蹤結果，該個體在遷移飛行時並未有撞擊本計畫風場風機的風險。

該個體途經中國江蘇與遼寧，在 111 年 7 月 17 日抵達俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克邊疆區的繁殖地(圖 2.1-6)(Bamford et al. 2008)，並在當地待了兩個多禮拜後，在 111 年 8 月 1 日開始往南移動，南遷時該個體沒有像北返時多次跨海，路徑選擇偏陸域，最後定位點是 111 年 8 月 20 日在中國溫州的海邊。

自 112 年 5 月 2 日起，太平洋金斑鵒所背負的發報器又重新傳訊，顯示其 111 年 8 月由新北、桃園一帶登陸台灣，並由陸路往南抵達彰化，在 111 年 8 月底至隔年 5 月間，該太平洋金斑鵒持續活動於彰化二林的農田和芳苑的海濱地區(圖 2.1-3~4)。在 112 年的遷移季節，該個體在 112 年 5 月 2 日傍晚 5 點由彰化二林的度冬地啟程，18:00 左右由彰濱工業區出海展開北返航程，出海路徑並未通過本計畫風場，最近距離為 8.2 公里(圖 2.1-4)，該個體在台灣海峽的定位點有 6 個，平均飛行海拔高度為 580.7 公尺，有 5 個定位點海拔高度位於風機葉片高度範圍(圖 2.1-5、表 2.1-3)。若以追蹤路徑來看，該太平洋金斑鵒在遷移飛行時並未有撞擊本計畫風場風機的風險。

太平洋金斑鵒在抵達中國崇明東灘後，再出海經北韓、中國黑龍江省等地，112 年 5 月 25 日已抵達俄羅斯薩哈地區，路徑與 111 年的北返路徑大同小異，對照 111 年的最終繁殖地點，太平洋金斑鵒應有機會繼續往北前進(圖 2.1-6)。

發報器在 112 年 6 月 1 日後就未再成功定位，後續回傳數天沒有資料的空號後即未有訊號回傳。




圖 2.1-1 太平洋金斑鴉編號 7097 在 111 年 4 月 24 日出海遷移路徑





圖 2.1-2 太平洋金斑鵒編號 7097 在 111 年 4 月 24 日出海期間飛行航高

表 2.1-2 太平洋金斑鴿編號 7097 於 111 年春季遷移出海航高資訊

定位點數	平均航高 (mean±SD)	最大航高	定位點位於風機葉片 高度範圍百分比 (25m-235m)
5	1174.3 ± 744.8 m	2045.1 m	1(20%)

註：定位點最遠至新北外海 106km




圖 2.1-3 太平洋金斑鴿編號 7097 在 111 年秋季南遷(紅色)路徑及 112 年春季北返(綠色)路徑




圖 2.1-4 太平洋金斑鴿編號 7097 在 112 年 5 月 2 日出海遷移路徑(綠色)

表 2.1-3 太平洋金斑鴿編號 7097 於 112 年春季遷移出海航高資訊

定位點數	平均航高(mean±SD)	最大航高	位於風機葉扇高度範圍百分比(25m-235m)
6	580.7 ± 1058.2 m	2944.7 m	5(83%)



圖 2.1-6 太平洋金斑鴿編號 7097 在 111 年春季北返(白色)、秋季南遷(紅色)路徑及 112 年春季北返(綠色)路徑

二、太平洋金斑鶇(發報器編號：0C07)

於 112 年 10 月 18 日繫放(圖 2.1-7)，由於本監測計畫所使用之發報器自今年 6 月起 4G 通訊版本上市，在台期間即可獲得資料，故於繫放後即開始獲取訊號。該個體在 10 月 19 日傍晚失去訊號，並未再回傳訊號(圖 2.1-8)，研究人員前往最後定位點(永興魚塭區)現場搜尋未果，推測發報器傳輸天線在鳥飛行過程折損或被鳥啄咬折損或其他外力而損壞。



圖 2.1-7 現場繫放照片-太平洋金斑鶇編號(0C07)



圖 2.1-8 太平洋金斑鶇編號 0C07 繫放後之活動定位點

三、太平洋金斑鶺(發報器編號：0C05)

於本季(113年2月25日)繫放(圖 2.1-9)，目前活動於彰化沿海地區(圖 2.1-10)。



圖 2.1-9 現場繫放照片-太平洋金斑鶺編號(0C05)




圖 2.1-10 太平洋金斑鶺編號 0C05 繫放後之活動定位點

四、太平洋金斑鶺(發報器編號：0C01)

於本季(113年2月28日)繫放(圖 2.1-11)，目前活動於彰化沿海地區(圖 2.1-12)。



圖 2.1-11 現場繫放照片-太平洋金斑鴉編號(0C01)








圖 2.1-12 太平洋金斑鴉編號 0C01 繫放後之活動定位點

總結本季追蹤繫放成果，1 隻太平洋金斑鴉之發報器於 112 年 6 月 1 日後即無成功定位，並於後續回傳數天沒有資料的空號後即再無訊號回傳；1 隻太平洋金斑鴉在台追蹤後即無訊號回傳；2 隻太平洋金斑鴉目前活動於彰化沿海地區。

2.2 鳥類雷達監測


本季(112年12月~113年2月)共進行5次鳥類雷達調查，詳表2.2-1，分析結果說明如後。

表 2.2-1 本季雷達調查日期及相關資訊


季別	日期 (農曆)	日落時間	隔日日出時間	時間長度	雷達掃描方式	月相圖
112年 冬季	112年12月26日 (十四)	17:18	06:38	24 小時	水平及 垂直	
	113年1月29日 (十九)	17:41	06:40	24 小時	水平及 垂直	
	113年1月30日 (二十)	17:42	06:39	24 小時	水平及 垂直	
	113年1月31日 (廿一)	17:43	06:39	24 小時	水平及 垂直	
	113年2月17日 (初八)	17:54	06:29	24 小時	水平及 垂直	

資料來源：中央氣象署

本計畫於 112 年冬季（112 年 12 月~113 年 2 月）共執行 5 次雷達調查，水平雷達調查共記錄飛行軌跡 303 筆，垂直雷達記錄 807 筆，雷達回波圖如圖 2.2-1 所示。




112 年 12 月 26 日鳥類雷達調查回波圖




113 年 1 月 29 日鳥類雷達調查回波圖

註. 本計畫雷達儀器掃描週期為 1.25 秒/次，且飛行軌跡可能受鳥類個體大小或大量鳥群而影響其訊號強度，故針對調查期間擷取鳥類軌跡相對清楚之時間點。

圖 2.2-1 112 年冬季雷達回波圖




113 年 1 月 30 日 鳥類雷達調查回波圖



113 年 1 月 31 日 鳥類雷達調查回波圖

註. 本計畫雷達儀器掃描週期為 1.25 秒/次, 且飛行軌跡可能受鳥類個體大小或大量鳥群而影響其訊號強度, 故針對調查期間擷取鳥類軌跡相對清楚之時間點。

圖 2.2-1 112 年冬季雷達回波圖(續 1)



註. 本計畫雷達儀器掃描週期為 1.25 秒/次，且飛行軌跡可能受鳥類個體大小或大量鳥群而影響其訊號強度，故針對調查期間擷取鳥類軌跡相對清楚之時間點。

圖 2.2-1 112 年冬季雷達回波圖(續 2)

表 2.2-2 112 年冬季雷達調查記錄表

調查日期		水平雷達筆數	垂直雷達筆數
112 年 冬季	112 年 12 月 26 日	27	48
	113 年 1 月 29 日	40	107
	113 年 1 月 30 日	99	132
	113 年 1 月 31 日	53	106
	113 年 2 月 17 日	84	414
	總計	303	807

2.2.1 活動時間

綜合112年冬季垂直雷達調查結果，可發現在夜間有較多鳥類飛行活動，總計夜間 18:00 至 06:00 間所記錄的飛行鳥類筆數 449 筆佔所有垂直雷達筆數的 55.6%。而水平雷達調查則同樣以夜間 18:00 至 06:00 間所記錄的筆數略多 195 筆，佔所有水平雷達筆數的 64.4%（圖 2.2.1-1、圖 2.2.1-2）。




圖 2.2.1-1 112 年冬季垂直雷達調查時間分佈




圖 2.2.1-2 112 年冬季水平雷達調查時間分佈

2.2.2 飛行高度

綜合112年冬季垂直雷達分析鳥類飛行高度資料，鳥類過境期間最主要利用的飛行高度為150至200公尺高度之空域為109筆，佔記錄筆數的13.5%，如圖2.2.2-1所示。由日夜間的飛行高度分佈結果來看，日間以0至50公尺高度空域的筆數最多為60筆，佔日間記錄筆數的16.8%；夜間則以150至200公尺高度空域的筆數最多67筆，佔夜間記錄筆數的14.9%，如圖2.2.2-2及2.2.2-3所示。冬季平均飛行高度為 237.4 ± 178.2 公尺。




圖 2.2.2-1 112 年冬季垂直雷達調查高度分佈




圖 2.2.2-2 112 年冬季垂直雷達日間調查高度分佈




圖 2.2.2-3 112 年冬季垂直雷達夜間調查高度分佈

2.2.3 飛行方向

綜合112年冬季水平雷達分析鳥類飛行方向，可發現主要的飛行方向為朝向南南西方飛行 95 筆，佔所有記錄軌跡的 31.4%，其次為朝向南方 78 筆，佔所有記錄軌跡的 25.7%。冬季飛行軌跡如圖 2.2.3-1 所示。飛行方向日間以朝向南方為主，日間為 27 筆，佔日間總筆數的 25.0%；夜間以朝向南南西方為主，夜間為 70 筆，佔夜間總筆數的 35.9%，如圖 2.2.3-2 及 2.2.3-3 所示。




圖 2.2.3-1 112 年冬季日間（左）及夜間（右）鳥類飛行軌跡




圖 2.2.3-2 112 年冬季水平雷達調查鳥類飛行方向




圖 2.2.3-3 112 年冬季水平雷達日間（左）及夜間（右）調查鳥類飛行方向

2.2.4 飛行速度

112 年冬季水平雷達所記錄飛行軌跡的平均飛行速度為 5.7 ± 1.9 m/s，由於在追蹤距離較短的軌跡時，速度易受時間秒差而有較大的誤差，因此僅統計追蹤距離大於 1 公里的軌跡。分析後可發現，追蹤距離 1 公里以上之軌跡共 302 筆，主要的鳥類飛行速度區間為 5-8 m/s，軌跡共 168 筆，佔 55.6%，如圖 2.2.4-1 所示。




圖 2.2.4-1 112 年冬季水平雷達調查追蹤距離超過 1 公里軌跡之飛行速度

2.3 陸域鳥類

本季(112年12月~113年2月)執行3次調查，調查範圍詳圖1.5-7所示，分析結果說明如下。

一、種屬組成

本季共記錄9目25科53種701隻次。記錄物種為南亞夜鷹、小雨燕、紅隼、白尾八哥、家八哥、白頭翁、麻雀、灰頭鷓鴣、棕扇尾鷓鴣、褐頭鷓鴣、斑文鳥、洋燕、家燕、棕沙燕、白鵲鴿、東方黃鵲鴿、斯氏繡眼、藍磯鶇、小雲雀、紅尾伯勞、棕背伯勞、大卷尾、喜鵲、三趾濱鶇、小青足鶇、赤足鶇、青足鶇、紅胸濱鶇、黑腹濱鶇、磯鶇、翻石鶇、鷹斑鶇、小環頸鴿、太平洋金斑鴿、灰斑鴿、東方環頸鴿、鐵嘴鴿、高蹺鴿、黑腹燕鷗、黑嘴鷗、銀鷗、棕三趾鶇、紅鳩、珠頸斑鳩、野鴿、大白鷺、小白鷺、中白鷺、夜鷺、黃頭鷺、蒼鷺、紅冠水雞及黑翅鳶等(表2.3-1)。

二、特有種及保育類物種

本季記錄6種臺灣特有亞種，分別為南亞夜鷹、小雨燕、白頭翁、褐頭鷓鴣、大卷尾及棕三趾鶇。保育類記錄3種珍貴稀有保育類野生動物，分別為紅隼、黑嘴鷗及黑翅鳶，1種其他應予保育之野生動物為紅尾伯勞(表2.3-1、表2.3-2、圖2.3-1)。

表 2.3-1 本季海岸鳥類調查結果統計表

目名	科名	中文名	學名	特有性 ¹	保育等級 ²	臺灣遷徙習性 ³	112年			113年		
							12月	1月	2月	12月	1月	2月
夜鷹目	夜鷹科	南亞夜鷹	<i>Caprimulgus affinis</i>	特亞		留	3				4	
雨燕目	雨燕科	小雨燕	<i>Apus nipalensis</i>	特亞		留	4	12			9	
隼形目	隼科	紅隼	<i>Falco tinnunculus</i>		II	冬					1	
雀形目	八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>			引進種	18	7			14	
		家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>			引進種	6	6			8	
	鵯科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>	特亞		留	9	9			7	
	麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>			留	35	17			18	
	扇尾鶯科	灰頭鷓鴣	<i>Prinia flaviventris</i>			留	2				2	
		棕扇尾鶯	<i>Cisticola juncidis</i>			留	2	2			2	
		褐頭鷓鴣	<i>Prinia inornata</i>	特亞		留	7				4	
	梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>			留	7	6			8	
	燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>			留	9	8			7	
		家燕	<i>Hirundo rustica</i>			夏,冬,過	9	7			6	
		棕沙燕	<i>Riparia chinensis</i>			留	1					
	鵯科	白鵯	<i>Motacilla alba</i>			留,冬	2	4			2	
		東方黃鵯	<i>Motacilla tschutschensis</i>			冬,過	1	9			3	
	繡眼科	斯氏繡眼	<i>Zosterops simplex</i>			留	5	5			5	
	鶇科	藍磯鶇	<i>Monticola solitarius</i>			留,冬	1	4			2	
	百靈科	小雲雀	<i>Alauda gulgula</i>			留	10	6			6	
	伯勞科	紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>			III	冬,過	2				
棕背伯勞		<i>Lanius schach</i>			留					1		
卷尾科	大卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>	特亞		留,過	2	4					
鴉科	喜鵲	<i>Pica serica</i>			引進種	2				3		
鶇形目	鶇科	三趾濱鶇	<i>Calidris alba</i>			冬	2				4	
		小青足鶇	<i>Tringa stagnatilis</i>			冬,過	1					
		赤足鶇	<i>Tringa totanus</i>			冬	1					
		青足鶇	<i>Tringa nebularia</i>			冬	4	7			5	
		紅胸濱鶇	<i>Calidris ruficollis</i>			冬		4				
		黑腹濱鶇	<i>Calidris alpina</i>			冬	8	13			12	
		磯鶇	<i>Actitis hypoleucos</i>			冬	2				2	
		翻石鶇	<i>Arenaria interpres</i>			冬,過	2					
	鶇科	鷹斑鶇	<i>Tringa glareola</i>			冬,過	2					
		小環頸鶇	<i>Charadrius dubius</i>			留,冬	1					
		太平洋金斑鶇	<i>Pluvialis fulva</i>			冬		8				
		灰斑鶇	<i>Pluvialis squatarola</i>			冬		3				
		東方環頸鶇	<i>Charadrius alexandrinus</i>			留,冬	28	10			13	
	長腳鶇科	高蹺鶇	<i>Himantopus himantopus</i>			留,冬	4	9			5	
	鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>			冬,過		6			4	
		黑嘴鷗	<i>Saundersilarus saundersi</i>			II	冬				1	
		銀鷗	<i>Larus argentatus</i>			冬		3				
三趾鶇科	棕三趾鶇	<i>Turnix suscitator</i>	特亞		留	2				3		
鶇形目	鳩科	紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>			留	8	4			6	
		珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>			留	4	3			2	
		野鳩	<i>Columba livia</i>			引進種	4	9			8	
鶇形目	鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>			留,夏,冬	8	4			10	
		小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>			留,夏,冬,過	23	9			30	
		中白鷺	<i>Ardea intermedia</i>			夏,冬		3				
		夜鷺	<i>Nycticorax nycticorax</i>			留,冬,過	1	2				
		黃頭鷺	<i>Bubulcus ibis</i>			留,夏,冬,過	4	8			7	
		蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>			冬	3	5			4	

表 2.3-1 本季海岸鳥類調查結果統計表(續)

目名	科名	中文名	學名	特有性 ¹	保育等級 ²	臺灣遷徙習性 ³	112年		113年	
							12月	1月	2月	
鶴形目	秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>			留	2			3
鷹形目	鷹科	黑翅鳶	<i>Elanus caeruleus</i>		II	留	1			1
總計(隻次)							253	218	230	
歧異度指數							3.25	3.40	3.29	
均勻度指數							0.86	0.96	0.92	

註1：特有種：「特亞」表臺灣特有亞種。

註2：「II」表珍貴稀有保育類野生動物；「III」表其他應予保育之野生動物。

註3：臺灣遷徙習性：「留」表留鳥；「冬」表冬候鳥；「夏」表夏候鳥；「過」表過境鳥；「引進種」表非原生之外來物種。

表 2.3-2 本季海岸鳥類保育類位置

調查日期	物種名稱	數量(隻次)	座標 ^註		行為
			X	Y	
112/12/12	黑翅鳶	1	187440	2665397	飛行
	紅尾伯勞	2	190512	2668737	停棲
113/01/02	黑嘴鷗	1	190693	2668153	飛行
113/02/05	黑翅鳶	1	188573	2666309	飛行
	紅隼	1	187037	2665730	飛行

註：座標系統為 TWD97 (二度分帶)。



圖例

— 海岸鳥調查路線 ● 紅隼 ▲ 黑嘴鷗 + 黑翅鳶 ◆ 紅尾伯勞(2)

註1：() 內數字表隻次

註2：調查日期為 112 年 12 月 12 日、113 年 1 月 2 日及 2 月 5 日

圖 2.3-1 本季海岸鳥類調查保育類物種分布圖

三、遷徙習性

本季調查鳥種所佔比例之中，有 18 種屬於留鳥，佔總記錄物種的 34.0%；21 種屬於候鳥（含過境鳥）性質（39.6%）；9 種兼具留鳥及候鳥（含過境鳥）性質（17.0%）；4 種屬於引進種性質（7.5%）；1 種兼具留鳥及過境鳥性質（1.9%）。

四、優勢物種

本季共記錄總數量 701 隻次，其中以麻雀 70 隻次最高，佔總數量的 10.0%，其次為小白鷺（62 隻次，8.8%）及東方環頸鴿（51 隻次，7.3%）。

五、指數分析

本季歧異度指數介於 3.25~3.40，均勻度指數介於 0.86~0.96。

本季調查範圍內物種組成豐富，且受優勢物種影響不明顯，物種數量分布均勻，故多樣性指數皆高。

2.4 陸域生態

本季陸域生態調查範圍位於彰化縣彰濱工業區的崙尾區，調查範圍詳圖 1.5-6 所示，於 113 年 1 月 8~11 日執行陸域植物調查；113 年 1 月 2~5 日執行陸域動物調查，調查結果如下。

一、陸域植物調查

(一) 植物歸隸屬性分析

本季共記錄維管束植物 29 科 68 屬 77 種，其中衝擊區共記錄 19 科 32 屬 32 種，對照區共記錄 29 科 68 屬 77 種。裸子植物佔 1 科 1 屬 1 種，雙子葉植物佔 26 科 53 屬 61 種，單子葉植物佔 2 科 14 屬 15 種。按植物生長型劃分（表 2.4-1），計有喬木 10 種、灌木 8 種、草質藤本 7 種及草本 52 種。依植物屬性區分，計有原生種 36 種（包含特有種 1 種），歸化種 37 種（包含入侵種 17 種），栽培種有 4 種。由歸隸屬性分析發現，植物生長型以草本植物佔 67.5% 最多，喬木佔 13.0% 次之。物種組成中有 46.8% 為原生種。

調查範圍以禾本科（13 種）、菊科（11 種）及豆科（6 種）植物的種數最多，三科植物常出現於開闊的草生地及道路旁，其種子產量較高且生命週期短，對於環境適應性較強，能快速繁殖及擴散。

入侵植物種類計有 17 種，其中以菊科（7 種）最高。菊科植物其種子產量較高及生命週期短，且對於環境適應性較強，能快速繁殖及擴散。調查範圍入侵植物主要分布於草生荒地和道路及人造設施周邊之草生地，常見且成主要優勢的有大花咸豐草及大黍 2 種。

表 2.4-1 本季調查植物種類歸隸特性統計表

區域	歸隸特性		蕨類植物	裸子植物	雙子葉植物	單子葉植物	小計
調查範圍	分類	科	-	1	26	2	29
		屬	-	1	53	14	68
		種	-	1	61	15	77
	生長型	喬木	-	1	9	-	10
		灌木	-	-	8	-	8
		木質藤本	-	-	-	-	-
		草質藤本	-	-	7	-	7
		草本	-	-	37	15	52
	屬性	原生	-	-	25	11	36
		特有 ^註	-	-	1	-	1
		歸化	-	-	33	4	37
		入侵 ^註	-	-	15	2	17
		栽培	-	1	3	-	4
	衝擊區	分類	科	-	-	17	2
屬			-	-	24	8	32
種			-	-	24	8	32
生長型		喬木	-	-	4	-	4
		灌木	-	-	5	-	5
		木質藤本	-	-	-	-	-
		草質藤本	-	-	3	-	3
		草本	-	-	12	8	20
屬性		原生	-	-	8	6	14
		特有 ^註	-	-	-	-	-
		歸化	-	-	14	2	16
		入侵 ^註	-	-	7	2	9
		栽培	-	-	2	-	2
對照區		分類	科	-	1	26	2
	屬		-	1	53	14	68
	種		-	1	61	15	77
	生長型	喬木	-	1	9	-	10
		灌木	-	-	8	-	8
		木質藤本	-	-	-	-	-
		草質藤本	-	-	7	-	7
		草本	-	-	37	15	52
	屬性	原生	-	-	25	11	36
		特有 ^註	-	-	1	-	1
		歸化	-	-	33	4	37
		入侵 ^註	-	-	15	2	17
		栽培	-	1	3	-	4

註：特有包含於原生，入侵包含於歸化，故以斜體並靠右對齊呈現。

1. 珍貴稀有保育植物分布現況

調查範圍所記錄之植物，未記錄有文化資產保存法公告之珍貴稀有植物；行政院環境部植物生態評估技術規範之特稀有植物，有第三級之臺灣蒺藜 1 種；2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄之國家受威脅（National Threatened）之野生維管束植物，屬瀕危（Endangered, EN）之粗穗馬唐 1 種，另記錄接近受脅（Near-Threatened, NT）的有臺灣蒺藜 1 種，其中上季生長於植物樣區 T1 周邊之族群，於本季調查時僅發現其乾枯的殘穗，推測受冬季自然消長之影響，而上季生長於鄰近地區風機周邊草生荒地及計畫區施工入口處路旁草生荒地之粗穗馬唐及原沿路邊零星生長之臺灣蒺藜，推測皆受冬季自然消長之影響，故使本季調查未能於原記錄點發現其蹤跡(表 2.4-2 及圖 2.4-1)，雖本季僅發現乾枯殘穗，仍已請相關單位留意，並於臨路側設置警示帶阻隔，勿故意踩踏及堆置物料於粗穗馬唐上，無需特別澆灌，避免植物休眠期水分過多，其使春季自然生長即可。

2. 受保護樹木分布現況

調查範圍未調查有符合行政院農業部令訂定「森林以外之樹木普查方法及受保護樹木認定標準」（行政院農業部，2016）第二條及「彰化縣樹木保育自治條例」（彰化縣政府，2008）的老樹。

表 2.4-2 本計畫調查範圍稀有植物資料表

中文名 ¹	特稀有 ²	紅皮書 ³	區系 ⁴	座標 (TWD97 二度分帶)		記錄區域
				X	Y	
臺灣蒺藜	第三級	NT	特有	188545	2667139	對照區
粗穗馬唐		EN	原生	188860	2666904	對照區
粗穗馬唐		EN	原生	188292	2667215	衝擊區
粗穗馬唐		EN	原生	188316	2667260	衝擊區

註 1：「中文名」欄顯示植物之中文俗名。

註 2：「特稀有」欄顯示植物生態評估技術規範（行政院環境部 2002）中之特稀有植物分級，按稀有程度區分為第一至第四級，並以第一級最具保育迫切性；另註明文化資產保存法公告之珍貴稀有植物。

註 3：「紅皮書」欄顯示臺灣植物紅皮書編輯委員會（2017）中的物種受威脅等級，物種評估等級接近受脅（Near Threatened, NT）。其中瀕危（EN）屬國家受威脅的野生維管束植物。

註 4：「區系」欄顯示植物區位屬性，可分為原生（種）及臺灣地區的特有（種）。




圖 2.4-1 本季稀有植物分布位置圖

(二) 植被類型及特性描述

1. 人工林

調查範圍內主要的植被類型為人工林及草生荒地，人為栽植的優勢樹種以木麻黃及黃槿 2 種為主，地被視其樹冠鬱閉程度而有不同，多有大黍、紅瓜及大花咸豐草等 3 種生長。

2. 草生荒地

分布於調查範圍內道路旁，依主要優勢物種為狗牙根及大黍 2 種，視環境不同還有大花咸豐草、馬鞍藤及田菁等 3 種生長。可大致區分為 4 型：

(1) 狗牙根型

常見於道路旁裸露地。優勢物種為狗牙根，成大片生長，常與大花咸豐草混生。

(2) 四生臂形草型

常見於道路旁裸露地。優勢物種為四生臂形草，多成片生長，常與馬鞍藤及田菁 2 種混生。

(3) 馬鞍藤型

常見於道路旁裸露地。優勢物種為馬鞍藤，成大片生長，常與平原菟絲子及大花咸豐草 2 種混生。

(4) 大黍型

常見於道路旁邊裸露地。優勢物種為大黍，多成片生長，常與馬鞍藤及狗牙根 2 種混生。

(三) 植物樣區調查

1. 植群組成優勢度分析

本調查範圍內主要由人工林及草生荒地構成，共設置 4 個森林樣區及 5 個草生地樣區，T1 樣區位於衝擊區內北側；T5 樣區位於對照區內北側；T6 樣區位於衝擊區外南側；T4 樣區位於對照區東側（圖 1.5-6）。各樣區環境因子（表 2.4-

3) 、植群組成及覆蓋度分析結果分述如下：

(1) 森林樣區木本植物

分析 4 個樣區優勢度結果，木本植物共記錄 2 種，黃槿 (IV=65.67) 及木麻黃 (IV=34.33)，兩者株數多且胸徑多為 3~10 公分之喬木，整體而言優勢種類皆為人為栽植物種 (表 2.4-4~5)。

(2) 森林樣區地被植物

樣區地被層主要優勢物種部分，T1、T4 及 T5 樣區主要皆為大黍，T6 樣區主要為狗牙根。分析樣區優勢度結果，地被植物共記錄 12 種，以大黍(IV=36.08)為最高，其次為黃槿小苗 (IV=13.14)，其餘物種零星散布，覆蓋度較低，IV 值均在 10.11 以下 (表 2.4-6~7)。

(3) 草生地樣區植物

樣區主要優勢物種部分，H2、H3 樣區為馬鞍藤，H4 樣區為大黍，H5 樣區為四生臂形草，H6 樣區為狗牙根。分析樣區優勢度結果，草生地植物共記錄 10 種，以狗牙根(IV=25.99)為最優勢，其次為馬鞍藤 (IV=20.42) 及大黍 (IV=12.76)，其餘物種零星散布，相對覆蓋度較低，IV 值均在 11.19 以下 (表 2.4-8~9)。

表 2.4-3 本季調查範圍植物樣區環境資料

樣區編號	植被類型	座標 (TWD97 二度分帶)		面積 (m ²)	海拔 (m)
		X	Y		
T1	森林	188292	2667215	100	6
T2(損毀)	森林	188592	2667791	100	3
T3(損毀)	森林	187985	2666977	100	4
T4	森林	188803	2666952	100	4
T5	森林	187830	2666550	100	4
T6	森林	187666	2666294	100	4
H1(損毀)	草生地	188259	2667130	4	5
H2	草生地	188569	2667122	4	3
H3	草生地	187658	2666530	4	4
H4	草生地	188860	2666934	4	4
H5	草生地	188717	2667259	4	3
H6	草生地	188030	2666825	4	3

註：座標系統為 TWD97 (二度分帶)。

表 2.4-4 本季調查範圍森林樣區木本植物組成表

樣區	中文名	DBH (cm)				斷面積 (m ² /ha)
		1~3	3~10	>10	總株數	
T1	黃槿	3	78	1	82	19.41
	木麻黃	1	5	5	11	11.35
T4	木麻黃	0	9	12	21	27.26
	黃槿	40	40	0	80	5.38
T5	黃槿	28	190	0	218	50.92
	木麻黃	1	3	0	4	0.86
T6	木麻黃	0	12	8	20	18.24
	黃槿	31	38	0	69	4.26

表 2.4-5 本季調查範圍森林樣區木本植物總合分析表

中文名	DBH (cm)				斷面積 (m ² /ha)	相對密度	相對頻度	相對優勢度	IV
	1~3	3~10	>10	總株數					
黃槿	102	346	1	449	79.97	88.91	50.00	58.09	65.67
木麻黃	2	29	25	56	57.70	11.09	50.00	41.91	34.33
總計						100.00	100.00	100.00	100.00

表 2.4-6 本季調查範圍森林樣區地被植物組成表

樣區	中文名	屬性	覆蓋度 (%)
T1	大黍	入侵	6
	黃槿	原生	5
	紅瓜	歸化	4
	大花咸豐草	入侵	3
	田菁	歸化	2
	木麻黃	栽培	1
	毛西番蓮	入侵	1
T4	大黍	入侵	9
	毛蓮子草	歸化	8
	紅瓜	歸化	7
	大花咸豐草	入侵	4
	波氏巴豆	歸化	2
	黃槿	原生	2
	狗牙根	原生	2
	毛西番蓮	入侵	1
	紅毛草	入侵	1
	孟仁草	歸化	1
T5	大黍	入侵	65
	黃槿	原生	5
	大花咸豐草	入侵	3
T6	狗牙根	原生	5
	孟仁草	歸化	3
	黃槿	原生	3
	大黍	入侵	2
	紅瓜	歸化	1

註：覆蓋度，取樣時地表非完全被植物所覆蓋，會有裸露地，故植物覆蓋度加總並非 100%。

表 2.4-7 本季調查範圍森林樣區地被植物總合分析表

中文名	覆蓋度	頻度	相對頻度 (%)	相對優勢度 (%)	IV
大黍	82	100.00	16.00	56.16	36.08
黃槿	15	100.00	16.00	10.27	13.14
紅瓜	12	75.00	12.00	8.22	10.11
大花咸豐草	10	75.00	12.00	6.85	9.42
狗牙根	7	50.00	8.00	4.79	6.40
孟仁草	4	50.00	8.00	2.74	5.37
毛蓮子草	8	25.00	4.00	5.48	4.74
毛西番蓮	2	50.00	8.00	1.37	4.68
波氏巴豆	2	25.00	4.00	1.37	2.68
田菁	2	25.00	4.00	1.37	2.68
紅毛草	1	25.00	4.00	0.68	2.34
木麻黃	1	25.00	4.00	0.68	2.34
總計			100.00	100.00	100.00

註：相對覆蓋度，為將裸露度去除後，單純以植物的覆蓋百分比呈現。

表 2.4-8 本季調查範圍草生地樣區植物組成表

樣區	中文名	屬性	覆蓋度 (%)
H2	馬鞍藤	原生	6
	大花咸豐草	入侵	3
	平原菟絲子	入侵	3
	穗花木藍	原生	2
	狗牙根	原生	2
	田菁	歸化	1
	銀膠菊	入侵	1
H3	馬鞍藤	原生	53
	狗牙根	原生	4
	賽蜀豆	入侵	2
	大花咸豐草	入侵	1
	田菁	歸化	1
H4	大黍	入侵	31
	馬鞍藤	原生	2
	大花咸豐草	入侵	1
H5	四生臂形草	原生	49
	田菁	歸化	7
	馬鞍藤	原生	4
	狗牙根	原生	3
	大黍	入侵	3
	大花咸豐草	入侵	2
	H6	狗牙根	原生
大黍		入侵	1
田菁		歸化	1

註：覆蓋度，取樣時地表非完全被植物所覆蓋，會有裸露地，故植物覆蓋度加總並非 100%。

表 2.4-9 本季調查範圍草生地樣區植物總合分析表

中文名	覆蓋度	頻度	相對頻度 (%)	相對優勢度 (%)	IV
狗牙根	95	80.00	16.67	35.32	25.99
馬鞍藤	65	80.00	16.67	24.16	20.42
大黍	35	60.00	12.50	13.01	12.76
四生臂形草	49	20.00	4.17	18.22	11.19
田菁	10	80.00	16.67	3.72	10.19
大花咸豐草	7	80.00	16.67	2.60	9.63
平原菟絲子	3	20.00	4.17	1.12	2.64
穗花木藍	2	20.00	4.17	0.74	2.46
賽蜀豆	2	20.00	4.17	0.74	2.46
銀膠菊	1	20.00	4.17	0.37	2.27
總計			100.00	100.00	100.00

註：相對覆蓋度，為將裸露度去除後，單純以植物的覆蓋百分比呈現。

2. 歧異度指數分析

(1) 森林樣區木本植物

木本植物因多數為防風林植栽物種，故組成以少數物種為主，歧異度指數 (H') 介於 0.09 至 0.53 間，以 T6 樣區 0.53 較高，其物種數最多， $E5$ 指數介於 0.39 至 0.76 間，以 T6 樣區 0.76 較高，表示其組成最為均勻 (表 2.4-10)。

(2) 森林樣區地被植物

地被植物物種組成，視其樹冠鬱閉程度及環境而有不同，歧異度指數 (H') 介於 0.42 至 2.00 間，以 T4 樣區 2.00 較高， $E5$ 指數介於 0.48 至 0.89 間，以 T6 樣區 0.89 較高，表示其組成最為均勻 (表 2.4-11)。

(3) 草生地樣區植物

草生地植物因生育地環境較嚴峻，故物種組成以少數物種為主，豐富度較低，歧異度指數 (H') 介於 0.12 至 1.77 間，以 H2 樣區 1.77 較高，其物種數相對較多且各種覆蓋度較為均勻， $E5$ 指數介於 0.43 至 0.83 間，以 H2 樣區 0.83 較高，表示其各物種覆蓋度較為均勻 (表 2.4-12)。

表 2.4-10 本季調查範圍森林樣區木本植物多樣性指數表

樣區編號	種數 (S)	歧異度 (H')	歧異度 (λ)	N_1	N_2	$E5$
T1	2	0.36	0.79	1.44	1.26	0.60
T4	2	0.51	0.67	1.67	1.49	0.74
T5	2	0.09	0.96	1.09	1.04	0.39
T6	2	0.53	0.65	1.70	1.53	0.76

多樣性指數說明：

S：調查範圍內植物種數。

H' ：Shannon-Wiener 指數；代表群落中物種亂度。數值越高表示物種及個體數量分布越平均。

λ ：Simpson 指數，代表群落中優勢集中程度。數值越高表示優勢度集中於少數物種之現象越明顯。

N_1 ：群落中優勢種數。數值越高表示優勢種越多。

N_2 ：群落中最具優勢種數。數值越高表示最具優勢種數越多；最具優勢種為優勢種中相對強勢物種。

$E5$ (Evenness index 5)：為廣泛使用之均勻度指數。數值愈高則代表該群落組成均勻度高。

表 2.4-11 本季調查範圍森林樣區地被植物多樣性指數表

樣區編號	種數 (S)	歧異度 (H')	歧異度 (λ)	N_1	N_2	$E5$
T1	7	1.77	0.19	5.88	5.26	0.87
T4	10	2.00	0.16	7.36	6.08	0.80
T5	3	0.42	0.80	1.52	1.25	0.48
T6	5	1.49	0.24	4.46	4.08	0.89

多樣性指數說明：

S：調查範圍內植物種數。

H' ：Shannon-Wiener 指數；代表群落中物種亂度。數值越高表示物種及個體數量分布越平均。

λ ：Simpson 指數，代表群落中優勢集中程度。數值越高表示優勢度集中於少數物種之現象越明顯。

N_1 ：群落中優勢種數。數值越高表示優勢種越多。

N_2 ：群落中最具優勢種數。數值越高表示最具優勢種數越多；最具優種為優勢種中相對強勢物種。

$E5$ (Evenness index 5)：為廣泛使用之均勻度指數。數值愈高則代表該群落組成均勻度高。

表 2.4-12 本季調查範圍草生地樣區植物多樣性指數表

樣區編號	種數 (S)	歧異度 (H')	歧異度 (λ)	N_1	N_2	$E5$
H2	7	1.77	0.20	5.89	5.06	0.83
H3	5	0.55	0.76	1.73	1.31	0.43
H4	3	0.35	0.84	1.43	1.20	0.46
H5	6	1.02	0.54	2.76	1.86	0.49
H6	3	0.12	0.96	1.13	1.05	0.35

多樣性指數說明：

S：調查範圍內植物種數。

H' ：Shannon-Wiener 指數；代表群落中物種亂度。數值越高表示物種及個體數量分布越平均。

λ ：Simpson 指數，代表群落中優勢集中程度。數值越高表示優勢度集中於少數物種之現象越明顯。

N_1 ：群落中優勢種數。數值越高表示優勢種越多。

N_2 ：群落中最具優勢種數。數值越高表示最具優勢種數越多；最具優種為優勢種中相對強勢物種。

$E5$ (Evenness index 5)：為廣泛使用之均勻度指數。數值愈高則代表該群落組成均勻度高。

二、陸域動物調查

(一) 哺乳類

1. 物種組成

本季僅衝擊區發現 1 目 1 科 1 種，為臭鼩 1 隻次，對照區未記錄物種，其調查名錄詳見表 2.4-13。

2. 特有性

本季未記錄到臺灣特有物種。

3. 保育等級

本季未記錄到保育類物種。

4. 優勢物種

本季衝擊區僅目擊記錄臭鼩 1 隻次，對照區未記錄物種，衝擊區及對照區皆未有優勢種。

5. 指數分析

本季衝擊區僅記錄單一物種，故歧異度指數皆為 0.00，均勻度指數皆無法計，對照區未記錄物種，故多樣性指數無法計算。

表 2.4-13 本季哺乳類資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育等級	113 年 1 月	
						衝擊區	對照區
鼩形目	尖鼠科	臭鼩	<i>Suncus murinus</i>			1	
總計 (隻次)						0	11
歧異度指數						0.00	-
均勻度指數						- ^註	-

註：「-」表無法計算。

(二) 鳥類

1. 物種組成

本季共記錄 7 目 19 科 30 種，衝擊區記錄 5 目 11 科 12 種；對照區記錄 7 目 19 科 30 種，其調查名錄詳見表 2.4-14。

2. 特有性

本季記錄南亞夜鷹、小雨燕、白頭翁、褐頭鷓鴣及大卷尾等 5 種為臺灣特有亞種。

3. 保育等級

本季記錄紅隼 1 種珍貴稀有保育類野生動物（圖 2.4-2）。

4. 遷徙習性

本季記錄鳥種中，有 14 種屬於留鳥（含過境鳥）性質，佔總記錄種數的 46.7%；7 種屬於候鳥（含過境鳥）性質（23.3%）；6 種兼具留鳥及候鳥（含過境鳥）性質（20.0%）；1 種兼具留鳥及過境鳥性質（3.3%）；2 種屬引進之外來種性質（6.7%）。

5. 優勢物種

本季衝擊區共記錄 36 隻次，以麻雀 6 隻次最高，佔總數量的 16.7%，其餘物種數量介於 1~5 隻次；對照區共記錄 210 隻次，其中以東方環頸鴿 30 隻次最多，佔總數量的 14.3%，其次為麻雀（16 隻次，佔 7.6%）。

6. 指數分析

本季衝擊區歧異度指數為 2.35，均勻度指數為 0.94，對照區歧異度指數為 3.11，均勻度指數為 0.91。本季記錄物種組成豐富，且物種數量分布均勻，故多樣性指數均高。


表 2.4-14 本季鳥類資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性 ¹	保育等級 ²	臺灣遷徙習性 ³	113年1月	
							衝擊區	對照區
夜鷹目	夜鷹科	南亞夜鷹	<i>Caprimulgus affinis</i>	特亞		留	1	3
雨燕目	雨燕科	小雨燕	<i>Apus nipalensis</i>	特亞		留		9
隼形目	隼科	紅隼	<i>Falco tinnunculus</i>		II	冬		2
雀形目	八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>			引進種	3	10
		家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>			引進種	2	8
	鵯科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>	特亞		留	3	11
	麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>			留	6	16
	扇尾鶯科	灰頭鷓鴣	<i>Prinia flaviventris</i>			留		3
		棕扇尾鶯	<i>Cisticola juncidis</i>			留		2
		褐頭鷓鴣	<i>Prinia inornata</i>	特亞		留	2	4
	梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>			留		12
	燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>			留	5	7
		家燕	<i>Hirundo rustica</i>			夏, 冬, 過		10
	鵲鴝科	白鵲鴝	<i>Motacilla alba</i>			留, 冬		5
東方黃鵲鴝		<i>Motacilla tschutschensis</i>			冬, 過		1	
	伯勞科	棕背伯勞	<i>Lanius schach</i>			留		1
	卷尾科	大卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>	特亞		留, 過	1	5
	繡眼科	斯氏繡眼	<i>Zosterops simplex</i>			留		2
	鶉科	藍磯鶉	<i>Monticola solitarius</i>			留, 冬		3
	百靈科	小雲雀	<i>Alauda gulgula</i>			留	2	14
鴝形目	鶉科	青足鶉	<i>Tringa nebularia</i>			冬		2
		黑腹濱鶉	<i>Calidris alpina</i>			冬		10
		磯鶉	<i>Actitis hypoleucos</i>			冬	2	3
	鴝科	東方環頸鴝	<i>Charadrius alexandrinus</i>			留, 冬		30
鴝形目	鳩鴝科	紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>			留	4	7
		珠頸斑鳩	<i>Streptopelia chinensis</i>			留		6
鴝形目	鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>			留, 夏, 冬		3
		小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>			留, 夏, 冬, 過	5	8
		黃頭鷺	<i>Bubulcus ibis</i>			留, 夏, 冬, 過		10
		蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>			冬		3
總計 (隻次)							36	210
歧異度指數							2.35	3.11
均勻度指數							0.94	0.91

註 1：「特亞」表臺灣地區特有亞種。

註 2：「II」表珍貴稀有保育類野生動物。

註 3：「留」表留鳥、「夏」表夏候鳥、「冬」表冬候鳥、「過」表過境鳥、「引進種」表引進之外來種。



圖例
 0 0.25 0.5 1 Kilometers
 衝擊區 ● 紅隼
 對照區

圖 2.4-2 本季保育類鳥類分布位置圖

(三) 爬蟲類

1. 物種組成

本季共記錄 1 目 1 科 2 種，其調查名錄詳見表 2.4-15。

2. 特有性

本季未記錄到特有種。

3. 保育等級

本季未記錄到保育類物種。

4. 優勢物種

本季共記錄 14 隻次，其中以疣尾蝎虎 11 隻次最多。

5. 指數分析

本季衝擊區僅記錄 1 種物種，故歧異度指數為 0.00，均勻度指數無法計算，對照區歧異度指數為 0.59，均勻度指數為 0.85。整體而言，調查範圍內記錄物種組成不豐富，故多樣性指數皆低。

表 2.4-15 本季爬蟲類資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育等級	113 年 1 月	
						衝擊區	對照區
有鱗目	壁虎科	疣尾蝎虎	<i>Hemidactylus frenatus</i>			3	8
		無疣蝎虎	<i>Hemidactylus bowringii</i>				3
總計 (隻次)						3	11
歧異度指數						0.00	0.59
均勻度指數						- ^註	0.85

註：「-」表無法計算。

(四) 兩棲類

本季未記錄到物種，由於調查範圍以草生荒地、裸露地以及人造設施為主，靠近濱海區，缺乏水域環境供兩生類棲息，且本季調查為冬季，兩棲類活動頻度較低，故未記錄到兩棲類活動。

(五) 蝶類

1. 物種組成

本季共記錄 1 目 3 科 5 種，衝擊區記錄 1 目 3 科 4 種；對照區記錄 1 目 3 科 4 種，其調查名錄及數量詳見表 2.4-16，物種多記錄於草生荒地活動。

2. 特有性

本季未記錄到臺灣特有種。

3. 保育等級

本季未記錄到保育類物種。

4. 優勢物種

本季共記錄 25 隻次，衝擊區共記錄 9 隻次，物種數量介於 2~3 隻次；對照區共記錄 16 隻次，物種數量介於 3~6 隻次。

5. 指數分析

本季衝擊區歧異度指數為 1.37，均勻度指數為 0.99；對照區歧異度指數為 1.34，均勻度指數為 0.97。本季物種數量分布均勻，故均勻度指數皆高。

表 2.4-16 本季蝶類資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育等級	113 年 1 月	
						衝擊區	對照區
鱗翅目	粉蝶科	白粉蝶	<i>Pieris rapae crucivora</i>			3	6
		亮色黃蝶	<i>Eurema blanda arsakia</i>			2	3
		纖粉蝶	<i>Leptosia nina niobe</i>				3
	灰蝶科	藍灰蝶	<i>Zizeeria maha okinawana</i>			2	4
	弄蝶科	禾弄蝶	<i>Borbo cinnara</i>			2	
總計 (隻次)						9	16
歧異度指數						1.37	1.34
均勻度指數						0.99	0.97

(六) 蜻蜓類

1. 物種組成

本季共記錄 1 目 1 科 1 種，其中衝擊區及對照區皆記錄 1 目 1 科 1 種，其調查名錄及數量詳見表 2.4-17。

2. 特有性

本季未記錄到臺灣特有種。

3. 保育等級

本季未記錄到保育類物種。

4. 優勢物種

本季衝擊區僅記錄薄翅蜻蜓 1 種 3 隻次；對照區僅記錄薄翅蜻蜓 1 種 5 隻次。

5. 指數分析

本季衝擊區及對照區僅記錄單一物種，故歧異度指數皆為 0.00，均勻度指數皆無法計算。整體而言，調查範圍內以草生荒地、裸露地以及人造設施為主，靠近濱海區，且周圍多為道路，缺乏供蜻蜓棲息之水域環境。

表 2.4-17 本季調查蜻蜓資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育等級	113 年 1 月	
						衝擊區	對照區
蜻蛉目	蜻蜓科	薄翅蜻蜓	<i>Pantala flavescens</i>			3	5
總計 (隻次)						3	5
歧異度指數						0.00	0.00
均勻度指數						— ^註	— ^註

註：「—」表無法計算。

2.5 營建噪音

本季於 112 年 12 月 12 日、113 年 1 月 15 日及 2 月 23 日在電氣室旁進行營建噪音(L_{eq} 及 L_{max})及營建低頻(L_{eq})監測，其監測成果分別彙整於表 2.5-1 及表 2.5-2。

一、營建噪音

依據彰化縣政府公告之噪音管制區分類，本測站屬第四類管制區，本測站 112 年 12 月份監測結果之均能音量 L_{eq} 測值為 58.4dB(A)，最大音量 L_{max} 為 67.9dB(A)；113 年 1 月份監測結果之均能音量 L_{eq} 測值為 61.2dB(A)，最大音量 L_{max} 為 66.8dB(A)；113 年 2 月份監測結果之均能音量 L_{eq} 測值為 63.3dB(A)，最大音量 L_{max} 為 74.7dB(A)。其監測結果皆可符合第四類營建工程噪音管制標準值 ($L_{eq}=80$ dB(A)，及 $L_{max}=100$ dB(A))。

表 2.5-1 本季營建噪音監測結果分析表

測站	監測日期	均能音量 L_{eq} (dB(A))	最大音量 L_{max} (dB(A))
電氣室	112.12.12	58.4	67.9
	113.01.15	61.2	66.8
	113.02.23	63.3	74.7
第四類營建工程噪音管制標準 (20 Hz 至 20k Hz)		80	100

註：表列營建噪音管制標準為行政院環境部 102 年 8 月 5 日修正發布之噪音管制標準(環署空字第 1020065143 號令)。

二、營建低頻噪音

依據彰化縣政府公告之噪音管制區分類，本測站屬第四類管制區，本測站 112 年 12 月份監測結果低頻均能音量 $L_{eq,LF}$ 測值為 40.0 dB(A)；113 年 1 月份監測結果低頻均能音量 $L_{eq,LF}$ 測值為 43.4 dB(A)；113 年 2 月份監測結果低頻均能音量 $L_{eq,LF}$ 測值為 42.2 dB(A)，其監測結果皆可符合第四類營建工程低頻噪音管制標準值 ($L_{eq,LF}=49$ dB(A))。

表 2.5-2 本季營建低頻噪音監測結果分析表

測站	監測日期	均能音量 $L_{eq,LF}$ (dB(A))
電氣室旁	112.12.12	40.0
	113.01.15	43.4
	113.02.23	42.2
第四類營建工程低頻噪音管制標準 (20 Hz 至 200 Hz)		49.0

註：表列營建噪音管制標準為行政院環境部 102 年 8 月 5 日修正發布之噪音管制標準(環署空字第 1020065143 號令)。

2.6 空氣品質

本季於 112 年 12 月 9 日至 11 日在蚵寮代天府及秀傳醫院旁等敏感點進行空氣品質監測，其監測項目包括 TSP、PM₁₀、PM_{2.5}、SO₂、NO_x(NO、NO₂)、CO、O₃、風速及風向等，其監測成果彙整於表 2.6-1，逐時監測結果詳見附錄 4-6，測站位置詳參圖 1.5-5。本季空氣品質監測結果，各測站各測值均符合空氣品質標準值。

表 2.6-1 本季空氣品質監測結果分析表

測站		蚵寮代天府	秀傳醫院旁	空氣品質標準
監測日期		112.12.10~11	112.12.09~10	
TSP ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 小時值	106	91	—
PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	日平均值	47	55	100
PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 小時值	32	26	35
SO ₂ (ppm)	最大小時平均值	0.003	0.003	0.75
	日平均值	0.002	0.003	—
NO _x (ppm)	最大小時平均值	0.030	0.023	—
	日平均值	0.014	0.015	—
NO(ppm)	最大小時平均值	0.007	0.004	—
	日平均值	0.002	0.003	—
NO ₂ (ppm)	最大小時平均值	0.023	0.019	0.100
	日平均值	0.011	0.012	—
CO(ppm)	最大小時平均值	0.5	0.7	35
	最大 8 小時平均值	0.3	0.4	9
O ₃ (ppm)	最大小時平均值	0.058	0.059	0.120
	最大 8 小時平均值	0.053	0.054	0.060
風速(m/s)		2.2	0.9	—
最頻風向		南南東	西南西	—
氣溫(°C)		25.6	23.9	—
相對溼度(%)		84	67	—

註：1. 表列空氣品質標準為行政院環境部 109 年 9 月 18 日環署空字第 1091159220 號令修正發布之空氣品質標準。
2. 「—」係表該項目無法規標準。

2.7 文化資產

本計畫於陸纜開挖範圍、陸上設施開挖處之開挖期間進行考古人員跟隨監看，監看位置詳參圖 1.5-8。本季無陸纜開挖或陸上設施開挖行為，故無需執行監看。

2.8 鯨豚生態

一、一般視覺監測

本季共執行 3 趟次的鯨豚目視調查，其中 12 月進行 1 趟次、1 月進行 1 趟次、2 月進行 1 趟次，其實際調查之軌跡路線圖如圖 2.8-1。本季出海總里程為 443.0 公里，總時數為 34.02 小時，扣除離線努力量，穿越線上調查里程為 159.2 公里，線上調查時數為 11.60 小時(表 2.8-1)。本季於穿越線上未目擊鯨豚，標準化目擊率為 0。

表 2.8-1 本季海上目視調查目擊以及里程與小時記錄表

趟次	日期	穿越線		總努力量		線上努力量		線上目擊群(隻)
		去	回	總里程(公里)	總時間(時)	里程(公里)	時間(時)	
01	2023/12/09	3	1	135.0	11.09	54.0	3.80	0
02	2024/01/31	7	3	150.0	11.32	53.2	4.02	0
03	2024/02/01	5	2	158.0	11.61	52.0	3.78	0
	小計			443.0	34.02	159.2	11.60	-




圖 2.8-1 本季鯨豚目視調查之軌跡路線圖

二、水下聲學監測

本季監測時間為 112 年 12 月 9 日至 112 年 12 月 22 日，共布放 5 個監測站(請詳圖 1.5.2)，調查資料解析時間彙整如表 2.8-2。

表 2.8-2 調查及資料解析時間

調查月份	點位	開始時間	結束時間	說明
112 年第四季 (12~2 月)	TPC-1	112.12.09	112.12.22	—
	TPC-2	112.12.09	112.12.22	—
	TPC-3	112.12.09	112.12.22	—
	TPC-4	112.12.09	112.12.22	—
	TPC-5	112.12.09	112.12.22	—

(一) 背景噪音

水下噪音資料分析各點測站環境噪音時頻分析之時頻譜圖如圖 2.8-2 所示，1 Hz 累積機率分布結果如圖 2.8-3 所示。

由圖 2.8-2 時頻譜圖顯示，各量測點皆有明顯的週期性噪音能量特徵，主要是來自於潮汐週期海水流動所衍生之噪音，主要影響在 100 Hz 以下的頻段，其中又以 TPC-5 在 12/16~12/18 及 12/20~12/23 間最為明顯，此外各點測站皆有觀測到頻繁的船舶噪音。由圖 2.8-3 累積機率分布顯示，各量測點於低頻帶之變動量皆相當明顯，其中又以 TPC-1、TPC-3 及 TPC-5 低頻帶噪音能量較大，在 1k Hz 附近頻帶的變動量以 TPC-4 及 TPC-5 最為明顯，而 TPC-5 為整體變動量變化較為顯著。




圖 2.8-2 本計畫風場 TPC-1~TPC-5 環境噪音時頻譜圖








圖 2.8-3 TPC-1~TPC-5 環境噪音 1-Hz band 累積機率分布

(二) 鯨豚聲音分析

1. 鯨豚哨叫聲偵測

本季各測站的鯨豚哨叫聲偵測分析結果如表 2.8-3 所示，本季 5 個測站監測期間為 336 小時，結果顯示 TPC-1 共偵測到 376 次哨叫聲，平均次數為 1.1 次；偵測到的時數為 16 小時，偵測率為 4.8%；TPC-2 共偵測到 325 次哨叫聲，平均次數為 1.0 次，偵測到的時數為 16 小時，偵測率為 4.8%；TPC-3 共偵測到 892 次哨叫聲，平均次數為 2.7 次，偵測到的時數為 19 小時，偵測率為 5.7%；TPC-4 共偵測到 1,542 次哨叫聲，平均次數為 4.6 次，偵測到的時數為 19 小時，偵測率為 5.7%；TPC-5 共偵測到 908 次哨叫聲，平均次數為 2.7 次，偵測到的時數為 22 小時，偵測率為 6.5%。

表 2.8-3 各點位之鯨豚哨叫聲偵測分析結果

季別	測站	監測時間 (hr)	偵測次數 (次)	平均次數 (次)	偵測時數 (hr)	偵測率 (%)
112 年 第四季	TPC-1	336	376	1.1	16	4.8%
	TPC-2	336	325	1.0	16	4.8%
	TPC-3	336	892	2.7	19	5.7%
	TPC-4	336	1,542	4.6	19	5.7%
	TPC-5	336	908	2.7	22	6.5%

2. 鯨豚喀答聲偵測

本季各測站的鯨豚喀答聲偵測分析結果如表 2.8-4 所示，本季 5 個測站監測期間為 336 小時，結果顯示 TPC-1 共偵測到 5,394 次喀答聲，平均次數為 16.1 次，偵測到的時數為 21 小時，偵測率為 6.3%；TPC-2 共偵測到 4,464 次喀答聲，平均次數為 13.3 次，偵測到的時數為 21 小時，偵測率為 6.3%；TPC-3 共偵測到 2,308 次喀答聲，平均次數為 6.9 次，偵測到的時數為 16 小時，偵測率為 4.8%；TPC-4 共偵測到 17,499 次喀答聲，平均次數為 55.1 次，偵測到的時數為 16

小時，偵測率為 4.8%；TPC-5 共偵測到 7,365 次喀答聲，平均次數為 21.9 次，偵測到的時數為 18 小時，偵測率為 5.4%。

表 2.8-4 各點位之鯨豚喀答聲偵測分析結果

季別	測站	監測時間 (hr)	偵測次數 (次)	平均次數 (次)	偵測時數 (hr)	偵測率 (%)
112 年 第四季	TPC-1	336	5,394	16.1	21	6.3%
	TPC-2	336	4,464	13.3	21	6.3%
	TPC-3	336	2,308	6.9	16	4.8%
	TPC-4	336	17,499	55.1	16	4.8%
	TPC-5	336	7,365	21.9	18	5.4%

第三章

檢討與分析

第三章 檢討與分析

3.1 監測結果檢討與因應對策

3.1.1 監測結果綜合檢討分析

茲將本季監測項目與上季、去年同季及環說時期之調查結果加以分析比較如下：

一、候鳥衛星繫放

本計畫統計至本季共完成 18 隻次候鳥衛星繫放作業。另於 112 年第一季增加候鳥追蹤樣本數，共 5 隻黃足鵠，112 年第三季增加繫放 1 隻太平洋金斑鴿，本季新增繫放 2 隻太平洋金斑鴿，彙整各繫放鳥隻追蹤情形如表 3.1.1-1 所示，以下針對本季監測摘述及本季與上季、去年同季成果比對，說明如下：

(一) 本季監測摘述

本季捕捉 2 隻太平洋金班鴿繫放，無鳥隻追蹤出海。

(二) 本季與上季比對

上季捕捉 1 隻太平洋金班鴿繫放，本季捕捉隻數多於上季，且皆無鳥隻追蹤出海。

(三) 本季與去年同季比對

本季與去年同季比對，捕捉隻數多於去年同季，且皆無鳥隻追蹤出海。

表 3.1.1-1 候鳥衛星繫放各鳥隻追蹤結果

鳥種	發報器編號	繫放日期	追蹤現況
灰斑鵒	6737	110.03.13	傳訊至 110 年 5 月 31 日，即未再傳訊
灰斑鵒	7093	110.03.13	傳訊至 110 年 6 月 17 日，即未再傳訊
太平洋金斑鵒	7100	110.03.13	於 110 年 6 月 18 日活動停止，可能為發報器脫落或死亡
灰斑鵒	6595	110.03.15	傳訊至 110 年 5 月 25 日，即未再傳訊
青足鵒	6733	110.10.05	無訊號回傳紀錄
太平洋金斑鵒	7097	111.01.02	傳訊至 112 年 6 月 1 日，即未再傳訊
灰斑鵒	6603	111.02.16	傳訊至 111 年 5 月 15 日，即未再傳訊
大濱鵒	7099	111.04.19	無訊號回傳紀錄
大濱鵒	7095	111.04.19	無訊號回傳紀錄
大濱鵒	7096	111.04.19	傳訊至 111 年 7 月 28 日，即未再傳訊
黃足鵒	083E	112.04.22	尚無訊號回傳紀錄
黃足鵒	083B	112.04.22	尚無訊號回傳紀錄
黃足鵒	0836	112.04.22	尚無訊號回傳紀錄
黃足鵒	083D	112.04.23	尚無訊號回傳紀錄
黃足鵒	073D	112.04.23	尚無訊號回傳紀錄
太平洋金斑鵒	0C07	112.10.18	傳訊至 112 年 10 月 19 日，即未再傳訊

註：依據過去執行經驗，曾在斷訊後 6 個月後仍有收到訊號，因此一般在斷訊後會持續追蹤 6 個月確認是否還會有訊號回傳。

表 3.1.1-2 候鳥衛星繫放本季與上季、去年同季
監測結果比對表

季次 \ 項目		繫放追蹤隻數	出海隻數	與本季比對結果
本季	112 年 第 4 季 (12-2 月)	2 隻太平洋金斑鶺	—	—
上季	112 年 第 3 季 (9-11 月)	1 隻太平洋金斑鶺	—	本季與上季比對，本季 捕捉隻數多於上季，且 皆無鳥隻追蹤出海
去年 同季	111 年 第 4 季 (12-2 月)	—	—	本季與去年同季比對， 捕捉隻數多於去年同 季，且皆無鳥隻追蹤出 海

二、鳥類雷達監測

以下針對本季監測摘述及本季(冬季)與上季(秋季)、去年同季及環說期間成果比對，說明如下：

(一) 本季監測摘述

本季共執行雷達調查 5 次，調查結果顯示在夜間有較多鳥類飛行活動，其飛行高度為 150 至 200 公尺高度之空域，並以南南西方為主要飛行方向，飛行速度區間為 5-8 m/s。

(二) 本季與上季比對

本季之水平雷達共記錄 303 筆，垂直雷達共 807 筆，鳥類主要利用鳥類主要利用 150 至 200 公尺高度空域飛行，飛行方向主要朝向南南西方飛行；而上季之水平雷達共記錄 2,682 筆，垂直雷達共 4,658 筆，鳥類主要利用鳥類主要利用 150 至 200 公尺高度空域飛行，飛行方向主要朝向南方飛行。

比較兩季鳥類活動量可發現本季雷達筆數較上季略低，筆數差異可能受海浪雜訊覆蓋使冬季整體數據有所低估。此外，本季飛行高度與上季相同。本季與上季飛行方向主要皆朝向南方飛行，依飛行方向推測應為秋季及冬季南遷度冬之冬候鳥。

(三) 本季與去年同季比對

本季之水平雷達共記錄 303 筆，垂直雷達共 807 筆，鳥類主要利用鳥類主要利用 150 至 200 公尺高度空域飛行，飛行方向主要朝向南南西方飛行；而去年同季之水平雷達共記錄 504 筆，垂直雷達共 1,653 筆，鳥類主要利用 150 至 200 公尺高度空域飛行，飛行方向主要朝向南方飛行。

比較兩季鳥類活動量可發現本季雷達筆數較去年同季略低。此外，本季飛行高度與上季相同。本季與去年同季飛行方向主要皆朝向南方飛行，推測應為冬季過境期間陸續南遷之冬候鳥。

(四) 與環說時期比對

本季（冬季）之水平雷達共記錄303筆，垂直雷達共807筆，鳥類主要利用鳥類主要利用150至200公尺高度空域飛行，飛行方向主要朝向南南西方飛行；而環說時期同季（106年12月13日）之水平雷達共記錄74筆，垂直雷達共210筆，鳥類主要利用150至200公尺高度空域飛行，飛行方向主要朝向南南東方飛行。

比較兩季鳥類活動量可發現本季雷達筆數較環說時期同季高，筆數差異可能受兩次調查時間間隔久遠而有所差異及努力量不同；飛行高度與環說同季相仿，兩季飛行方向主要朝南方飛行，推測應為冬季南遷度冬之冬候鳥。

表 3.1.1-3 鳥類雷達監測本季與上季、去年同季及環說時期同季監測結果比對表

項目		水平筆數	垂直筆數	主要飛行高度 (佔比)	主要飛行方向 (佔比)	與本季比對結果
季次						
本季	112年冬季	303	807	150至200公尺 (13.5%)	SSW (31.4%)	—
上季	112年秋季	2,682	4,658	150至200公尺 (20.7%)	S (34.9%)	本季雷達筆數較與上季低；本季與上季飛行高度相同；兩季調查鳥類整體皆朝南方飛行
去年同季	111年冬季	504	1,653	150至200公尺 (19.7%)	S (19.0%)	本季雷達筆數較與去年同季低；本季與去年同季飛行高度相同；兩季調查鳥類整體皆朝南方飛行
環說時期同季	106年(12月13日)	74	210	150至200公尺 (40.5%)	SSE (17.6%)	本季雷達筆數較與環說同季高；本季與環說同季飛行高度相同；兩季飛行方向主要朝南方飛行

表 3.1.1-4 鳥類雷達監測歷年監測結果

年度		項目	水平筆數	垂直筆數	主要飛行高度 (佔比)	主要飛行方向 (佔比)
111 年	111 年春季		3,950	4,739	150 至 200 公尺 (15.6%)	N (9.5%)
	111 年夏季		3,436	3,988	100 至 150 公尺 (17.2%)	SSE (9.6%)
	111 年秋季		5,708	17,836	500 公尺以上 (44.6%)	SSE (29.4%)
	111 年冬季		504	1,653	150 至 200 公尺 (19.7%)	S (19.0%)
112 年	112 年春季		1,400	3,037	500 公尺以上 (21.8%)	NNE (25.4%)
	112 年夏季		758	5,699	200 至 250 公尺 (19.1%)	S (13.1%)
	112 年秋季		2,682	4,658	150 至 200 公尺 (20.7%)	S (36.1%)
	112 年冬季		303	807	150 至 200 公尺 (13.5%)	SSW (34.4%)
環說 時期	106 年秋季 (9 月 27 日)		76	未執行 垂直雷 達調查	—	SE (22.4%)
	106 年冬季 (12 月 13 日)		74	210	150 至 200 公尺 (40.5%)	SSE (17.6%)
	107 年春 (3 月 1 日、 3 月 15 日、 4 月 4 日、 4 月 22 日、 5 月 12 日)		854	3,753	150 至 200 公尺 (17.1%)	NNE (26.0%)

三、陸域鳥類

以下針對本季監測摘述及本季(秋季)與上季(夏季)、去年同季及環說期間成果比對，說明如下：

(一) 本季監測摘述

本季共執行海岸鳥類目視調查 1 次，共記錄 9 目 25 科 53 種 701 隻次。

(二) 本季與上季比對

上季共記錄 10 目 28 科 61 種，本季較上季新記錄棕背伯勞、翻石鷗、灰斑鴿、黑嘴鷗、銀鷗及中白鷺等 6 種，未記錄八哥、黃頭扇尾鶯、黑頭文鳥、赤腰燕、黃尾鴿、鵲鴿、黑枕藍鷓、花嘴鴨、尖尾濱鷗、長趾濱鷗、黃足鷗、小燕鷗、燕鴿及東方澤鶯等 14 種，差異物種多為留鳥及冬候鳥。兩季皆以麻雀為優勢物種。

(三) 本季與去年同季比對

去年同季共記錄 9 目 23 科 39 種，本季較去年同季新記錄灰頭鷓鶯、棕沙燕、棕背伯勞、喜鵲、小青足鷗、赤足鷗、紅胸濱鷗、鷹斑鷗、小環頸鴿、太平洋金斑鴿、灰斑鴿、鐵嘴鴿、高蹺鴿、黑腹燕鷗、黑嘴鷗、中白鷺及夜鷺等 17 種，未記錄灰鵲鴿、黃尾鴿及東方澤鶯等 3 種，差異物種多為冬候鳥。去年同季以小白鷺為優勢物種，而本季則以麻雀為優勢物種。

(四) 與環說時期比對

本季較環說階段同季新記錄南亞夜鷹、小雨燕、紅隼、白尾八哥、家八哥、白頭翁、麻雀、灰頭鷓鶯、棕扇尾鶯、褐頭鷓鶯、斑文鳥、洋燕、家燕、棕沙燕、白鵲鴿、東方黃鵲鴿、斯氏繡眼、藍磯鶉、小雲雀、棕背伯勞、大卷尾、喜鵲、黑腹燕鷗、銀鷗、棕三趾鶉、紅鳩、珠頸斑鳩、野鴿、夜鷺及黑翅鳶等 30 種，未記錄翠鳥、小水鴨、花嘴鴨、大濱鷗、長趾濱鷗、紅腹濱鷗、斑尾鷗、蒙古鴿、反嘴鴿、埃及聖鸚及小鸚鵡等 11 種。環說階段同季以東方環頸鴿記錄數量較多，本季則以麻雀記錄數量較多，環說階段調查範圍除本計畫監測範圍外，尚包括自彰濱工業區到漢寶濕地之間的海岸地帶，兩者調查範圍及努力量有所不同，因此監測結果亦有所差異。

表 3.1.1-5 海岸鳥類本季與上季、去年同季及環說時期同季監測結果比對表

季次		項目	調查日期	種數	數量(隻次)	與本季比對結果
本季	112 年冬季		112/12	44	253	—
			113/01	35	218	
			113/02	36	230	
上季	112 年秋季		112/09	53	522	兩季相比，上季未記錄到 6 種，多記錄 14 種，差異物種多為留鳥及冬候鳥
			112/10	36	248	
			112/11	37	319	
去年同季	111 年冬季		111/12	30	171	兩季相比，去年同季未記錄到 17 種，多記錄 3 種 本季以麻雀記錄數量較多；去年同季以小白鷺記錄數量較多
			112/01	27	177	
			112/02	30	205	
環說時期同季	105 年冬季		105/12	35	6,681	兩季相比，環說階段同季未記錄到 30 種，多記錄 11 種 本季以麻雀記錄數量較多；環說階段同季以東方環頸鴿記錄數量較多

註：環說階段調查範圍除本計畫監測範圍外，尚包括自彰濱工業區到漢寶濕地之間的海岸地帶，兩者調查範圍及努力量有所不同，因此監測結果亦有所差異。

表 3.1.1-6 歷次海岸鳥類監測結果

季次		項目	調查日期	種數	數量(隻次)
111 年	111 年秋季		111/09	31	358
			111/10	30	389
			111/11	37	337
	111 年冬季		111/12	30	171
			112/01	27	177
			112/02	30	205
112 年	112 年春季		112/03	34	227
			112/04	32	324
			112/05	49	779
	112 年夏季		112/06	32	260
	112 年秋季		112/09	53	552
			112/10	36	248
			112/11	37	319
	112 年冬季		112/12	44	253
			113/01	35	218
		113/02	36	230	
環說時期	105 年夏季		105/07	33	6,446
	105 年秋季		105/09	50	9,931
			105/10	47	11,894
			105/11	39	8,312
	105 年冬季		105/12	35	6,681
	106 年春季		106/03	38	7,294
			106/04	43	10,308
		106/05	45	3,406	

四、陸域生態

本計畫陸域生態調查範圍位於彰化縣彰濱工業區的崙尾區；環評階段為彰濱工業區全區，以下針對本季調查摘述、去年同季及環說期間成果比對(如表 3.1.1-5 至 3.1.1-11)，說明如下：

(一) 本季監測摘述

1. 陸域植物

本季共記錄維管束植物 29 科 68 屬 77 種，型態以草本植物較多；屬性以原生種較多；記錄到 1 種稀有植物。

2. 哺乳類

本季共發現 1 目 1 科 1 種，未有明顯優勢物種。

3. 鳥類

本季共記錄 7 目 19 科 30 種，優勢種為東方環頸鴿。

4. 爬蟲類

本季共記錄 1 目 1 科 2 種，優勢種為疣尾蝎虎。

5. 兩棲類

本季調查結果並無兩棲類物種記錄。

6. 蝶類

本季共記錄 1 目 3 科 5 種，未有明顯優勢物種。

7. 蜻蜓類

本季共記錄 1 目 1 科 1 種，未有明顯優勢物種。

(二) 本季與上季比對

1. 陸域植物

上季共記錄 29 科 67 屬 75 種，本季共記錄 29 科 68 屬 77 種(如表 3.1.1-5)，本季較上季新紀錄野牽牛及蠅翼草 2 種。

2. 哺乳類

上季共記錄 3 目 3 科 4 種 11 隻次，本季共記錄 1 目 1 科 1 種 1 隻次（如表 3.1.1-6），本季較上季未記錄東亞家蝠、小黃腹鼠及溝鼠等 3 種，物種組成差異皆為零星記錄之小型哺乳類，兩季皆未有明顯優勢物種。

3. 鳥類

上季共記錄 6 目 19 科 26 種 220 隻次，本季共記錄 7 目 19 科 30 種 246 隻次（如表 3.1.1-7），本季較上季新增記錄南亞夜鷹、紅隼、家八哥、棕扇尾鶯、東方黃鶺鴒、棕背伯勞、藍磯鶇、黑腹濱鶇及蒼鶻等 9 種，未記錄喜鵲、紅尾伯勞、鷹斑鶇、高蹺鶇及黑翅鶻等 5 種，差異物種主要為零星記錄之留鳥及冬候鳥。上季以小白鶻為優勢物種，而本季則以東方環頸鶇為優勢。

4. 爬蟲類

上季共記錄 1 目 2 科 2 種 8 隻次，本季共記錄 1 目 1 科 2 種 14 隻次（如表 3.1.1-8），本季較上季新增記錄 1 種，未記錄印度蜥蜴 1 種，兩季物種組成差異皆為零星記錄，皆以疣尾蝎虎為優勢物種。

5. 兩棲類

上季共記錄 1 目 2 科 2 種 3 隻次，本季調查為冬季，兩棲類物種活動頻度較低，未記錄任何兩棲類。

6. 蝶類

上季共記錄 1 目 3 科 6 種 26 隻次，本季共記錄 1 目 3 科 5 種 25 隻次（如表 3.1.1-10），本季較上季新增記錄纖粉蝶及禾弄蝶 2 種，未記錄幻蛺蝶、波蛺蝶及黃鈎蛺蝶等 3 種。兩季物種組成差異皆為零星記錄，皆無明顯優勢物種。

7. 蜻蜓類

上季共記錄 1 目 1 科 1 種 9 隻次，本季共記錄 1 目 1 科 1 種

8 隻次（如表 3.1.1-11），本季與上季記錄物種相同，兩季皆未有明顯優勢物種。

(三) 本季與去年同季比對

1. 陸域植物

去年同季共記錄 24 科 47 屬 48 種，本季共記錄 29 科 68 屬 77 種(如表 3.1.1-5)，本季較去年同季新增紀錄鵝仔草、假千日紅、野苧蒿、倒刺狗尾草、野苧菜、龍葵、高野黍、雙稈草、南美獨行菜、鴨舌癩、賽芻豆、臺灣蒺藜、苦滇菜、假海馬齒、葎草、紫花藿香薊、青苧、粗穗馬唐、光果龍葵、假紫斑大戟、擬鴨舌癩、紅毛草、馬齒苋、草梧桐、美洲假蓬、燈籠草、欖仁、野牽牛及蠅翼草等 29 種。

2. 哺乳類

去年同季共記錄 2 目 2 科 2 種 3 隻次，本季共記錄 1 目 1 科 1 種 1 隻次（如表 3.1.1-6），本季較去年同季未記錄小黃腹鼠 1 種，物種組成差異皆為零星記錄之小型哺乳類，兩季皆未有明顯優勢物種。

3. 鳥類

去年同季共記錄 8 目 20 科 32 種 200 隻次，本季共記錄 7 目 19 科 30 種 246 隻次（如表 3.1.1-7），本季較去年同季新增紀錄紅隼及藍磯鶉 2 種，未記錄翻石鶉、棕三趾鶉、紅冠水雞及東方澤鶯等 4 種，差異物種主要為零星記錄之留鳥及冬候鳥。去年同季以麻雀為優勢物種，而本季則以東方環頸鴿為優勢。

4. 爬蟲類

去年同季共記錄 1 目 1 科 2 種 11 隻次，本季共記錄 1 目 1 科 2 種 14 隻次（如表 3.1.1-8），本季與去年同季記錄物種相同，皆以疣尾蝎虎為優勢物種。

5. 兩棲類

去年同季及本季皆未記錄到兩棲類。

6. 蝶類

去年同季共記錄 1 目 3 科 5 種 22 隻次，本季共記錄 1 目 3 科 5 種 22 隻次（如表 3.1.1-10），本季與去年同季記錄物種相同，皆無明顯優勢物種。

7. 蜻蜓類

去年同季共記錄 1 目 1 科 2 種 14 隻次，本季僅記錄薄翅蜻蜓 1 種 8 隻次（如表 3.1.1-11），本季較去年同季未記錄高翔蜻蜓 1 種，兩季皆未有明顯優勢物種。

(四) 與環說時期比對

1. 陸域植物

環說時期共記錄 34 科 95 屬 112 種，本季共記 29 科 68 屬 77 種（如表 3.1.1-5），本季調查相較環說書階段物種數明顯減少，推測為環說階段之物種數包含不在本計畫調查範圍內之植物樣區物種，且計畫範圍附近工區，有施工整地之行為，植被可能受翻擾及移除影響，也因受冬季自然消長之影響，本季較環說時期同季新記錄 28 種，較少紀錄 29 種。

稀有植物的部分，於環說時期調查記錄到繖楊及臺灣虎尾草 2 種，分別是臺灣植物紅皮書編輯委員會（2017）評估為瀕危（EN）及接近受脅（NT）的稀有植物，皆未有座標資訊，因此無法確認記錄位置，本季記錄到粗穗馬唐及臺灣蒺藜 2 種，分別是臺灣植物紅皮書編輯委員會（2017）評估為瀕危（EN）及接近受脅（NT）的稀有植。

2. 哺乳類

環說時期同季共記錄 3 目 3 科 5 種，本季僅記錄 1 目 1 科 1 種 1 種（如表 3.1.1-6），本季較環說時期同季未記錄小黃腹鼠及田鼯鼠等 2 種，新記錄臭鼩 1 種。環說時期同季以田鼯

鼠記錄數量較多，本季則無優勢物種。

3. 鳥類

環說時期同季共記錄 4 目 9 科 11 種，本季共記錄 7 目 19 科 30 種（如表 3.1.1-7），本季較環說時期同季新記錄南亞夜鷹、小雨燕、白尾八哥、家八哥、麻雀、灰頭鷓鴣、斑文鳥、洋燕、家燕、白鵲鴿、東方黃鵲鴿、棕背伯勞、大卷尾、藍磯鶇、青足鶇、黑腹濱鶇、磯鶇、東方環頸鴿、大白鷺、小白鷺、黃頭鷺及蒼鷺等 22 種，未記錄大花鸚、紅尾伯勞及棕三趾鶇等 3 種。環說時期同季以斯氏繡眼為優勢物種，本季則以東方環頸鴿記錄數量較多。

4. 爬蟲類

環說時期同季未記錄到爬蟲類，本季共記錄 1 目 1 科 2 種（如表 3.1.1-8），本季較環說時期同季新增記錄疣尾蝎虎及無疣蝎虎 2 種。

5. 兩棲類

環說階段同季與本季皆未記錄到兩棲類（如表 3.1.1-9），冬季兩棲類物種活動頻度較低。

調查範圍內以草生荒地、裸露地以及人造設施為主，靠近濱海區，缺乏水域環境供兩棲類棲息，環說階段於秋及冬季執行，調查時氣溫下降，且非多數兩棲類繁殖期，兩棲類物種活動頻度較低，未記錄任何兩棲類。整體而言，調查範圍內兩棲類物種組成較不豐富，將持續監測以了解物種數量變化之情形。

6. 蝶類

環說時期同季未記錄蝶類，本季共記錄 1 目 3 科 5 種（如表 3.1.1-10），本季較環說時期同季新增記錄亮色黃蝶、纖粉蝶、藍灰蝶及禾弄蝶等 4 種，未記錄豆波蛺蝶 1 種，環說時期同季及本季皆無明顯優勢物種。

7. 蜻蜓類

環說時期同季未記錄蜻蜓類，本季僅記錄薄翅蜻蜓 1 種（如表 3.1.1-11）。環說時期同季與本季物種組成相同，皆未有明顯優勢物種。

表 3.1.1-7 植物本季與上季、去年同季及環說時期同季監測結果比對表

季次		項目	調查日期	科	屬	種	與本季比對結果
本季	112 年冬季		113/01	29	68	77	—
上季	112 年秋季		112/10	29	67	75	兩季相比，上季未記錄到 2 種
去年同季	111 年冬季		112/01	24	47	48	兩季相比，去年同季未記錄到 29 種
環說時期同季	106 年冬季		106/02	34	95	112	本季調查相較環說書階段物種數明顯減少，推測為環說階段之物種數包含不在本計畫監測範圍內之植物樣區物種，且調查範圍內持續有其餘區域在進行施工整地，植被可能受翻擾及移除影響，本季較環說時期同季新記錄 28 種，較少紀錄 29 種

註：環說階段係針對整個彰濱地區（線西及鹿港）設置植物樣區，本計畫調查範圍為崙尾區上岸，因此監測階段針對實際開發範圍及周邊重新布設植物樣區，故調查結果數量與環評階段有所差異。

表 3.1.1-8 植物歷次監測結果

季次	項目	調查日期	科	屬	種
111 年	111 年秋季	111/11	23	40	41
	111 年冬季	112/01	24	47	48
112 年	112 年春季	112/04	28	60	63
	112 年夏季	112/07	29	65	72
	112 年秋季	112/10	29	67	75
	112 年冬季	113/01	29	68	77
環說時期	105 年秋季	105/11	33	90	107
	106 年冬季	106/02	34	95	112

表 3.1.1-9 哺乳類本季與上季、去年同季及環說時期同季監測結果比對表

季次		項目	調查日期	種數	數量 (隻次)	與本季比對結果
本季	112 年冬季		113/01	1	1	—
上季	112 年秋季		112/10	4	11	兩季相比，上季多記錄東亞家蝠、小黃腹鼠及溝鼠等 3 種，物種組成相似，兩季皆未有明顯優勢物種
去年同季	111 年冬季		112/01	2	3	兩季相比，去年同季多記錄小黃腹鼠 1 種，物種組成相似，兩季皆未有明顯優勢物種
環說時期同季	106 年冬季		106/02	2	6	兩季相比，環說時期同季多記錄小黃腹鼠及田鼯鼠等 2 種，未記錄臭鼩 1 種 本季無優勢物種，環說階段同季以田鼯為優勢物種

註. 環說階段陸域動物生態調查資料未有分區，故以全區來進行比較。

表 3.1.1-10 哺乳類歷次監測結果

季次		項目	調查日期	種數	數量 (隻次)
111 年	111 年秋季		111/11	4	8
	111 年冬季		112/01	2	3
112 年	112 年春季		112/04	4	7
	112 年夏季		112/07	4	7
	112 年秋季		112/10	4	11
	112 年冬季		113/01	1	1
環說時期	105 年秋季		105/11	4	12
	105 年冬季		106/02	2	6

表 3.1.1-11 鳥類本季與上季、去年同季及環說時期同季監測結果比對表

季次		項目	調查日期	種數	數量 (隻次)	與本季比對結果
本季	112 年冬季		113/01	30	246	—
上季	112 年秋季		112/10	26	220	兩季相比，上季未記錄到 9 種，多記錄 5 種，差異物種為留鳥及冬候鳥 本季以東方環頸鴿為優勢種，上季以小白鷺為優勢物種
去年同季	111 年冬季		112/01	32	200	兩季相比，去年同季未記錄到 2 種，多記錄 4 種，差異物種為留鳥及冬候鳥 本季以東方環頸鴿為優勢種，去年同季以麻雀為優勢物種
環說時期同季	106 年冬季		106/02	4	29	兩季相比，環說時期同季未記錄到 22 種，多記錄 3 種 本季以東方環頸鴿為優勢種，環說時期同季以斯氏繡眼為優勢物種

註. 環說階段陸域動物生態調查資料未有分區，故以全區來進行比較。

表 3.1.1-12 鳥類歷次監測結果

季次		項目	調查日期	種數	數量 (隻次)
111 年	111 年秋季		111/11	32	176
	111 年冬季		112/01	32	200
112 年	112 年春季		112/04	35	220
	112 年夏季		112/07	31	204
	112 年秋季		112/10	26	220
	112 年冬季		113/01	30	246
環說時期	105 年秋季		105/11	10	35
	105 年冬季		106/02	4	29

表 3.1.1-13 爬蟲類本季與上季、去年同季及環說時期同季監測結果比對表

季次		項目	調查日期	種數	數量 (隻次)	與本季比對結果
本季	112 年冬季		113/01	2	14	—
上季	112 年秋季		112/10	2	8	兩季相比，上季未記錄無疣蝮虎 1 種，多記錄印度蜓蜥 1 種，兩季皆以疣尾蝮虎為優勢物種
去年同季	111 年冬季		112/01	2	11	兩季相比，記錄物種相同，兩季皆以疣尾蝮虎為優勢物種
環說時期 同季	106 年冬季		106/02	0	0	兩季相比，環說時期同季未記錄到物種

註. 環說階段陸域動物生態調查資料未有分區，故以全區來進行比較。

表 3.1.1-14 爬蟲類歷次監測結果

季次		項目	調查日期	種數	數量 (隻次)
111 年	111 年秋季		111/11	2	9
	111 年冬季		112/01	2	11
112 年	112 年春季		112/04	2	13
	112 年夏季		112/07	2	10
	112 年秋季		112/10	2	8
	112 年冬季		113/01	2	14
	環說時期	105 年秋季		105/11	0
	105 年冬季		106/02	0	0

表 3.1.1-15 兩棲類本季與上季、去年同季及環說時期同季監測結果
比對表

季次		項目	調查日期	種數	數量 (隻次)	與本季比對結果
本季	112 年冬季		113/01	0	0	—
上季	112 年秋季		112/10	2	3	兩季相比，上季多記錄到 2 種 本季調查為冬季，兩棲類物種活動頻度較低，故未記錄任何兩棲類
去年同季	111 年冬季		112/01	0	0	兩季相比，皆未記錄到兩棲類
環說時期 同季	106 年冬季		106/02	0	0	兩季相比，皆未記錄到兩棲類

註. 環說階段陸域動物生態調查資料未有分區，故以全區來進行比較。

表 3.1.1-16 兩棲類歷次監測結果

季次		項目	調查日期	種數	數量 (隻次)
111 年	111 年秋季		111/11	2	6
	111 年冬季		112/01	0	0
112 年	112 年春季		112/04	2	11
	112 年夏季		112/07	2	4
	112 年秋季		112/10	2	3
	112 年冬季		113/01	0	0
環說時期	105 年秋季		105/11	0	0
	105 年冬季		106/02	0	0

表 3.1.1-17 蝶類本季與上季、去年同季及環說時期同季監測結果比對表

季次		項目	調查日期	種數	數量 (隻次)	與本季比對結果
本季	112 年冬季		113/01	5	26	—
上季	112 年秋季		112/10	6	26	兩季相比，上季未記錄到 2 種，多記錄 3 種，皆未有明顯優勢物種
去年同季	111 年冬季		112/01	8	19	兩季相比，兩季記錄物種相同，皆未有明顯優勢物種
環說時期同季	106 年冬季		106/02	2	13	兩季相比，環說時期未記錄到 4 種，多記錄 1 種，皆未有明顯優勢物種

註. 環說階段陸域動物生態調查資料未有分區，故以全區來進行比較。

表 3.1.1-18 蝶類歷次監測結果

季次		項目	調查日期	種數	數量 (隻次)
111 年	111 年秋季		111/11	8	19
	111 年冬季		112/01	5	22
112 年	112 年春季		112/04	5	32
	112 年夏季		112/07	7	27
	112 年秋季		112/10	6	26
	112 年冬季		113/01	5	25
環說時期	105 年秋季		105/11	2	13
	105 年冬季		106/02	0	0

**表 3.1.1-19 蜻蜓類本季與上季、去年同季及環說時期同季監測結果
比對表**

季次		項目	調查日期	種數	數量 (隻次)	與本季比對結果
本季	112 年冬季		113/01	1	8	—
上季	112 年秋季		112/10	1	9	兩季相比，兩季記錄物種相同，皆未有明顯優勢物種
去年同季	111 年冬季		112/01	2	14	兩季相比，去年同季多記錄到高翔蜻蜓 1 種，皆未有明顯優勢物種
環說時期 同季	106 年冬季		106/02	0	0	兩季相比，環說時期同季未記錄到蜻蜓類，皆未有明顯優勢物種

註. 環說階段陸域動物生態調查資料未有分區，故以全區來進行比較。

表 3.1.1-20 蜻蜓類歷次監測結果

季次		項目	調查日期	種數	數量 (隻次)
111 年	111 年秋季		111/11	2	9
	111 年冬季		112/01	2	14
112 年	112 年春季		112/04	2	16
	112 年夏季		112/07	2	11
	112 年秋季		112/10	1	9
	112 年冬季		113/01	1	8
環說時期	105 年秋季		105/11	1	1
	105 年冬季		106/02	0	0

五、營建噪音

營建噪音歷次監測結果如圖 3.1.1-1~2 所示。以下針對本季監測摘述及本季與上季、去年同季成果比對，說明如下：

(一) 本季監測摘述

本季營建噪音監測結果之均能音量 L_{eq} 測值介於 58.4~63.3 dB(A)，最大音量 L_{max} 介於 66.8~74.7 dB(A)，監測結果皆可符合第四類營建工程噪音管制標準值 ($L_{eq}=80$ dB(A)，及 $L_{max}=100$ dB(A))；本季營建低頻噪音監測結果低頻之均能音量 $L_{eq,LF}$ 測值介於 40.0~43.4 dB(A)，參考適用室內檢測第四類營建工程低頻噪音管制標準值 ($L_{eq,LF}=49$ dB(A))，監測結果皆可符合標準值。

(二) 本季與上季比對

上季營建噪音監測結果之均能音量 L_{eq} 測值介於 54.4~64.5 dB(A)，最大音量 L_{max} 介於 59.7~69.8 dB(A)，營建低頻噪音監測結果低頻之均能音量 $L_{eq,LF}$ 測值介於 36.0~45.9 dB(A)，與本季監測結果相比互有高低。整體而言，本季監測結果均符合管制標準，並無明顯異常現象。

(三) 本季與去年同季比對

去年同季營建噪音監測結果之均能音量 L_{eq} 測值介於 56.8~74.1 dB(A)，最大音量 L_{max} 介於 67.7~83.0 dB(A)，營建低頻噪音監測結果低頻之均能音量 $L_{eq,LF}$ 測值介於 40.1~42.1 dB(A)，與本季監測結果相比數值稍高，並無明顯異常現象。

表 3.1.1-21 本季與上季、去年同季營建噪音監測結果比對表

季次		項目	營建噪音		營建低頻噪音	與本季 比對結果
			均能音量 L _{eq}	最大音量 L _{max}	均能音量 L _{eq,LF}	
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	
本季	112 年 第 4 季 (12-2 月)	58.4~63.3	66.8~74.7	40.0~43.4	—	
上季	112 年 第 3 季 (9-11 月)	54.4~64.5	59.7~69.8	36.0~45.9	與本季監測結 果相比互有高 低	
去年 同季	111 年 第 4 季 (12-2 月)	56.8~74.1	67.7~83.0	40.1~42.1	與本季監測結 果相比數值稍 高	
		第四類營建工程噪 音管制標準 (20 Hz 至 20k Hz)	80	100	—	—
		第四類營建工程低 頻噪音管制標準 (20 Hz 至 200 Hz)	—		49.0	—

註：表列營建噪音管制標準為行政院環境部 102 年 8 月 5 日修正發布之噪音管制標準(環署空字第 1020065143 號令)。

表 3.1.1-22 營建噪音歷次監測結果

年度	監測日期		均能音量 L _{eq} (dB(A))	最大音量 L _{max} (dB(A))
111	第三季	111.09.20	60.7	65.5
		111.10.02	61.5	69.9
		111.11.10	62.2	71.6
	第四季	111.12.27	74.1	83.0
		112.01.10	60.3	70.2
		112.02.08	56.8	67.7
112	第一季	112.03.06	64.2	75.0
		112.04.12	59.0	69.9
		112.05.23	60.1	73.4
	第二季	112.06.12	59.8	74.3
		112.07.24	50.1	64.3
		112.08.22	62.4	77.7
	第三季	112.09.11	61.0	69.7
		112.10.23	64.5	69.8
		112.11.28	54.4	59.7
	第四季	112.12.12	58.4	67.9
		113.01.15	61.2	66.8
		113.02.23	63.3	74.7
第四類營建工程噪音管制標準 (20 Hz 至 20k Hz)			80	100

註：表列營建噪音管制標準為環境部 102 年 8 月 5 日修正發布之噪音管制標準(環署空字第 1020065143 號令)。

表 3.1.1-23 營建低頻噪音歷次監測結果

年度	監測日期		均能音量 L _{eq,LF} (dB(A))
111	第三季	111.09.20	39.6
		111.10.02	56.4
		111.11.10	45.1
	第四季	111.12.27	41.7
		112.01.10	42.1
		112.02.08	40.1
112	第一季	112.03.06	38.6
		112.04.12	39.9
		112.05.23	39.5
	第二季	112.06.12	39.6
		112.07.24	48.9
		112.08.22	47.6
	第三季	112.09.11	39.9
		112.10.23	45.9
		112.11.28	36.0
	第四季	112.12.12	40.0
		113.01.15	43.4
		113.02.23	42.2
第四類營建工程低頻噪音管制標準 (20 Hz 至 200 Hz)			49.0

註：1.表列營建噪音管制標準為環境部 102 年 8 月 5 日修正發布之噪音管制標準(環署空字第 1020065143 號令)。

2.灰底表超出「參考用第四類營建工程低頻噪音管制標準」





圖 3.1.1-1 歷次營建噪音均能音量值及最大音量值變化圖




圖 3.1.1-2 歷次營建低頻噪音均能音量值變化圖

六、空氣品質

空氣品質歷次監測結果如圖 3.1.1-3~5 所示。以下針對本季監測摘述及本季與上季、去年同季及環說期間成果比對，說明如下：

(一) 本季監測摘述

本季各測站 TSP 24 小時值介於 91~106 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，PM₁₀ 日平均值介於 47~55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，PM_{2.5} 24 小時值介於 26~32 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，各測站測值均符合空氣品質標準。

(二) 本季與上季比對

上季各測站 TSP 24 小時值介於 42~77 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，PM₁₀ 日平均值介於 21~43 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，PM_{2.5} 24 小時值介於 18~20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，兩季監測結果相比本季略高。整體而言，監測結果均符合空氣品質標準，並無明顯異常現象。

(三) 本季與去年同季比對

去年同季各測站 TSP 24 小時值介於 60~80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，PM₁₀ 日平均值介於 34~43 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，PM_{2.5} 24 小時值介於 15~16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，各測站測值均符合空氣品質標準，兩季監測結果相比本季略高，並無明顯異常現象。

(四) 與環說時期比對

環說時期之 TSP 24 小時值介於 39~130 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，PM₁₀ 日平均值介於 27~54 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，PM_{2.5} 24 小時值介於 10~35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。與本季結果相比，本季各測站測值介於環說時期各測站測值之間，並無明顯異常現象。

表 3.1.1-24 本季與上季、去年同季及環說時期空氣品質監測結果比對表

季次		項目	TSP	PM ₁₀	PM _{2.5}	與本季 比對結果
			24 小時 值	日平均值	24 小時 值	
			($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
本季	112 年 第四季 (12~2 月)	蚵寮代天府	106	47	32	—
		秀傳醫院旁	91	55	26	
上季	112 年 第三季 (9~11 月)	蚵寮代天府	42	21	18	本季監測結果 略高
		秀傳醫院旁	77	43	20	
去年 同季	112 年 第四季 (12~2 月)	蚵寮代天府	80	43	16	本季監測結果 略高
		秀傳醫院旁	60	34	15	
環說 時期	105.10	蚵寮代天府	121	54	13	本季各測站測 值介於環說時 期各測站測值 之間，並無明 顯異常現象
		秀傳醫院旁	39	27	10	
	105.11	蚵寮代天府	130	54	27	
		秀傳醫院旁	83	32	19	
	106.01	蚵寮代天府	82	46	35	
		秀傳醫院旁	97	51	34	
空氣品質標準			—	100	35	—

註：1. 表列空氣品質標準為行政院環境部 109 年 9 月 18 日環署空字第 1091159220 號令修正發布之空氣品質標準。

2. 「—」係表該項目無測值或法規標準。

表 3.1.1-25 空氣品質歷次監測結果

季次		項目	TSP	PM ₁₀	PM _{2.5}
			24 小時值	日平均值	24 小時值
			($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
111 年	第三季	蚵寮代天府	70	35	17
		秀傳醫院旁	73	40	10
	第四季	蚵寮代天府	80	43	16
		秀傳醫院旁	60	34	15
112 年	第一季	蚵寮代天府	86	51	34
		秀傳醫院旁	93	53	26
	第二季	蚵寮代天府	32	15	6
		秀傳醫院旁	83	42	23
	第三季	蚵寮代天府	42	21	18
		秀傳醫院旁	77	43	20
	第四季	蚵寮代天府	106	47	32
		秀傳醫院旁	91	55	26
環說時期	蚵寮代天府		82~130	46~54	13~35
	秀傳醫院旁		39~97	27~51	10~34
空氣品質標準			—	100	35

註：1. 表列空氣品質標準為行政院環保署 109 年 9 月 18 日環署空字第 1091159220 號令修正發布之空氣品質標準。

2. 「—」係表該項目無測值或法規標準。




圖 3.1.1-5 歷次細懸浮微粒 PM_{2.5} 24 小時值變化圖

七、文化資產

本計畫於 112 年 2 月開始進行電氣室開挖，本工程挖掘範圍內進行考古人員監看，以下針對本季監測摘述及本季與上季、去年同季成果比對，說明如下：

(一) 本季監測摘述

本季無陸纜開挖或陸上設施開挖行為，故無需執行監看。

(二) 本季與上季比對

本季無執行監看，上季監看結果未發現具文化歷史價值或意義之考古遺物，土質本季以暗赤灰色細砂土為主。

(三) 本季與去年同季比對

本季無執行監看，去年同季監看結果未發現具文化歷史價值或意義之考古遺物，土質以灰褐色砂土為主。

八、鯨豚生態

(一) 本季監測摘述

1. 一般視覺監測

本季共執行 3 趟次調查，本季調查穿越線上未目擊鯨豚。

2. 水下聲學監測

本季鯨豚偵測分析結果顯示，5 個測站皆有偵測到鯨豚活動跡象。

(二) 本季與上季比對

1. 一般視覺監測

上季共執行 3 趟次調查，本季調查趟次數與上季相同；而本季未於穿越線上目擊鯨豚，亦與上季相同。

2. 水下聲學監測

本季偵測鯨豚活動的時間約 16~22 個小時較上季(1~2 個小時)多，當冬季為相對較無海事工程活動時，鯨豚會再回到該海域活動，但後續仍需持續監測以更瞭解該海域鯨豚活動之變化。

(三) 本季與去年同季比對

去年同季尚未執行鯨豚生態調查。

(四) 與環說時期比對

1. 一般視覺監測

彙整環評階段的鯨豚調查，僅第一季有目擊鯨豚紀錄，累計目擊 6 群次鯨豚。現階段結果顯示，第一季(3-5 月)可能為該場域目擊鯨豚的主要季節(環評階段鯨豚目擊集中於 5 月，本監測計畫於 4 月目擊鯨豚)，推測該海域的鯨豚活動模式可能與台灣海峽的季風接替、洋流變化及魚群移動有

關，確實原因還待更多的調查累積相關的資訊方可進一步分析。

2. 水下聲學監測

環說時期未執行鯨豚水下聲學監測。

表 3.1.1-26 本季與上季及環說時期同季鯨豚生態(一般視覺監測)結果比對表

季次		項目	一般視覺監測		與本季比對結果
			目擊率(%)	目擊物種	
本季	112年第四季 (12~2月)		0	—	—
上季	112年第三季 (9~11月)		0	—	與本季相同。
環說時期同季	105年第四季		0	—	與本季相同。

註：去年同季尚未執行鯨豚生態調查。

表 3.1.1-27 鯨豚生態(一般視覺監測)歷次監測結果

季次		項目	一般視覺監測	
			趟次目擊率(%)	目擊物種
112	第一季(3~5月)		0.2	2群次瓶鼻海豚
	第二季(6~8月)		0	—
	第三季(9~11月)		0	—
	第四季(12~2月)		0	—
環說時期	105年第一季		0.5	4群次瓶鼻海豚、1群次偽虎鯨、1群次不明鯨豚
	105年第二季		0	—
	105年第三季		0	—
	105年第四季		0	—

表 3.1.1-28 本季與上季及環說時期同季鯨豚生態(水下聲學監測)
結果比對表

季次		項目	水下聲學監測偵測率(%)		與本季比對結果
			哨叫聲	喀答聲	
本季	112年 第四季 (12~2月)	TPC-1	4.8	6.3	—
		TPC-2	4.8	6.3	
		TPC-3	5.7	4.8	
		TPC-4	5.7	4.8	
		TPC-5	6.5	5.4	
上季	112年 第三季 (9~11月)	TPC-1	0	0	與本季相比較低。
		TPC-2	0	0	
		TPC-3	0	0	
		TPC-4	2	0.6	
		TPC-5	0	0.3	

註：去年同季尚未執行鯨豚生態調查，且環說時期未執行鯨豚水下聲學監測。

表 3.1.1-29 鯨豚生態(水下聲學監測)歷次結果

季次		項目	水下聲學監測 偵測率(%)	
			哨叫聲	喀答聲
112	第一季 (3~5月)	TPC-1	15.2	10.7
		TPC-2	16.7	12.8
		TPC-3	0.0	0.0
		TPC-4	9.8	11.9
		TPC-5	2.1	3.6
	第二季 (6~8月)	TPC-1	0	0
		TPC-2	0	0
		TPC-3	0	0
		TPC-4	0	0.6
		TPC-5	0	0
	第三季 (9~11月)	TPC-1	0	0
		TPC-2	0	0
		TPC-3	0	0
		TPC-4	2	0.6
		TPC-5	0	0.3
	第四季 (12~2月)	TPC-1	4.8	6.3
		TPC-2	4.8	6.3
		TPC-3	5.7	4.8
		TPC-4	5.7	4.8
		TPC-5	6.5	5.4

3.1.2 監測結果異常現象因應對策

本季環境監測結果之異常狀況及處理情形，詳見表 3.1.2-1。

表 3.1.2-1 本季監測之異常狀況及處理情形

異常狀況	因應對策及執行成效
無	—

3.2 建議事項

無。

參 考 文 獻

參考文獻

1. Bamford, M., D. Watkins, W. Bancroft, G. Tischler and J. Wahl. 2008. Migratory shorebirds of the East Asian - Australasian flyway: population estimates and internationally important sites. Wetlands International - Oceania. Canberra, Australia.
2. Branson, N. J. B. A., S. Yoshimitsu, C. Y. Chiang. and C. D. T. Minton. 2010. Movements of Grey-tailed Tattlers and Terek Sandpipers in the East Asian/Australasian Flyway. Stilt 57: 50-58.
3. Caccamise, D.F. and R.S., Hedin. 1985. An aerodynamic basis for selecting transmitter loads in birds. Wilson Bull 97: 306-318.
4. Cochran, W. W. 1980. Wildlife telemetry. Pp. 507-520 in Wildlife management techniques manual (S. D. Schemnitz, ed.). The Wildlife Society, Washington, D.C.
5. Flaherty, T. 2016. Satellite tracking of Grey Plover from South Australia to Russia. Journal of the Victorian Wader Study Group 39: 45-54.
6. Johnson, O.W., L. Fielding, J.P. Fisher, R.S. Gold, R.H. Goodwill, A.E. Bruner, J.F. Furey, P.A. Brusseau, N.H. Brusseau, P.M. Johnson, J. Jukema, L.L. Prince, M.J. Tenney and J.W. Fox. 2012. New insights concerning transoceanic migratory pathways of Pacific Golden-Plovers (*Pluvialis fulva*): the Japan stopover and other linkages as revealed by geolocators. Wader Study Group Bull. 119: 1-8.
7. Johnson, O.W., P.S. Tomkovich, R.R. Porter, E.Y. Loktionov and R.H.

- Goodwill. 2017. Migratory linkages of Pacific Golden-Plovers *Pluvialis fulva* breeding in Chukotka, Russian Far East. *Wader Study* 124: 33–39.
8. Bamford, M., D. Watkins, W. Bancroft, G. Tischler and J. Wahl. 2008. Migratory shorebirds of the East Asian - Australasian flyway: population estimates and internationally important sites. *Wetlands International - Oceania*. Canberra, Australia.
 9. Aumüller, R., L. Bach, H. Baier, H. Behm, A. Beiersdorf, M. Bellmann, ... & M. Boethling. (2013) Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (StUK4).
 10. Bruderer, B., D. Peter, T. Steuri. (1999) Behaviour of migrating birds exposed to X-band radar and a bright light beam. *Journal of Experimental Biology* 202: 1015-1022.
 11. Casement, M.B. 1966. Migration across the Mediterranean observed by radar. *Ibis* 109: 461-491.
 12. Desholm, M., A.D. Fox, P.D.L. Beasley, J. Kahlert. (2006) Remote techniques for counting and estimating the number of bird–wind turbine collisions at sea: a review. *Ibis* 148: 76-89.
 13. Graber, R.R., S.S. Hassler. (1962) The effectiveness of aircraft-type (APS) radar in detecting birds. *The Wilson Bulletin* 74: 367-380.
 14. Kahlert, J., I.K. Petersen, A.D. Fox, M. Desholm, I. Clausager. (2004) Investigations of birds during construction and operation of Nysted offshore wind farm at Rødsand, Annual status report 2003. National Environmental Research Institute, Rønde, Denmark.
 15. Boufford, D. E., H. Ohashi, T. C. Huang, C. F. Hsieh, J. L. Tsai, K. C.

- Yang, C. I. Peng, C. S. Kuoh and A. Hsiao. 2003. A checklist of the vascular plants of Taiwan. In: Huang, T. C. et al. (eds.) , Flora of Taiwan 2nd ed., Vol. 6. Editorial committee, Department of Botany, National Taiwan University, Taipei. p. 15-139.
16. Sutherland, W. J. 1996. Ecological census techniques: a handbook. Cambridge University Press. 336.
 17. Ludwig, J. A. and J. F. Reynolds. 1988. Statistical Ecology: A primer on methods and computing. John Wiley, New York. p. 337.
 18. Andersson, M.H. (2011) Offshore wind farms – ecological effects of noise and habitat alteration on fish. Doctoral dissertation. Stockholm University.
 19. Hong, E. (2000) The future impact of the Tanshui Habor on it's nearby coastal environment. Ecological and Environmental Symposium of Tanshui estuary. Oct. 14-15, 2000. Academia Sinica, Taipei.
 20. Lin, H. J., Shao, K. T. (1999) Seasonal and diel changes in a subtropical mangrove fish assemblage. Bulletin of marine science 65(3):775-794.
 21. Janssen J. (2004) Lateral line sensory ecology. In The Senses of Fish (eds) von der Emede G, Mogdans J, Kapoor BG. Narosa Publishing House, New Delhi, pp. 231-264.
 22. Siddagangaiah, S., Chen, C. F., Hu, W. C., & Pieretti, N. (2021). "Impact of pile-driving and offshore windfarm operational noise on fish chorusing." Remote Sensing in Ecology and Conservation,8(1), 119-134.
 23. Tzeng, W. N., Wang, Y. T. (1997). Movement of fish larvae with tidal flux in the Tanshui River Estuary, northern Taiwan. Zoological Studies 36(3):178-185.

24. Wang, Y. T., Tzeng, W. N. (1997). Temporal succession and spatial segregation of clupeoid larvae in the coastal waters off the Tanshui River Estuary, northern Taiwan. *Marine Biology* 129:23-32.
25. Wilhelmsson, D., M. T. Thompson, R. Tchon, J. Samntakos, G. McCormick, N., Luitjens, S. Gullstrom, M. Patterson Edisards, J.K. Amir, O. & Dabi, A. (eds.) (2012) *Greening Blue Energy: Identifying and managing the biodiversity risks and opportunities of offshore renewable energy*. Gland, Switzerland: IUCN:102 pp.
26. 光宇工程顧問有限公司，2020a。彰化近海 CIP 風場周邊海岸地鳥類繫放及衛星追蹤調查計畫冬季工作成果報告。
27. 光宇工程顧問有限公司，2020b。大彰化東南及西南風場周邊海岸地鳥類繫放及衛星追蹤調查計畫冬季工作成果報告。
28. 梁昇，1996。後處裡差分全球定位系統法之應用－桃園大圳取水口定位案例。水土保持學報 28：45-62。
29. 彰化縣政府，2016。彰化海岸濕地野生鳥類棲地環境經營計畫。104 年度國家重要濕地保育行動計畫。
30. 福爾摩莎自然史資訊有限公司，2017。台電二期離岸風力發電環境影響評估鳥類及陸域生態調查計畫與環境影響概述。
31. 中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會。2020。臺灣鳥類名錄。中華民國野鳥學會，臺北市。取自 <http://www.bird.org.tw/images/2020年鳥類名錄.pdf>。
32. 方偉宏。2010。臺灣鳥類全圖鑑。貓頭鷹出版社，臺北市。408 頁。
33. 向高世、李鵬翔、楊懿如。2009。台灣兩棲爬行類圖鑑。貓頭鷹出版

- 社，臺北市。336 頁。
34. 向高世。2008。台灣蜥蜴自然誌。天下文化出版社，臺北市。176 頁。
 35. 行政院農業部。2016。森林以外之樹木普查方法及受保護樹木認定標準。取自
http://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg022098/ch07/type1/gov62/num18/Eg.htm。
 36. 行政院農業部。2022。文化資產保存法施行細則。2022 年 1 月 28 日，取自 https://www.moc.gov.tw/information_309_19939.html。
 37. 行政院農業部。2019。陸域保育類野生動物名錄。2019 年 1 月 9 日，取自 <https://conservation.forest.gov.tw/0002021>。
 38. 行政院農業部林務局。2022。全球入侵種資料庫（中文版）。取自 <https://gisd.biodiv.tw/>。
 39. 行政院農業部特有生物研究保育中心。2019。台灣野生植物資料庫。取自 <http://plant.tesri.gov.tw/plant100/>。
 40. 行政院環境部。2002。植物生態評估技術規範。2002 年 03 月 28 日，取自 <https://www.epa.gov.tw/public/Data/57289282171.pdf>。
 41. 行政院環境部。2011。動物生態評估技術規範。2011 年 7 月 12 日，取自 <https://www.epa.gov.tw/public/Attachment/42231463933.pdf>。
 42. 林文宏。2020。猛禽觀察圖鑑。遠流出版事業股份有限公司，臺北市。248 頁。
 43. 林斯正、楊平世。2016。臺灣蜻蛉目昆蟲檢索圖鑑。特有生物研究保育中心，南投縣。288 頁。

44. 祁偉廉。2008。台灣哺乳動物。遠見天下出版有限公司，臺北市。255 頁。
45. 徐堉峰。2022。臺灣蝴蝶圖鑑（上）弄蝶、鳳蝶、粉蝶（修訂版）。晨星出版有限公司，臺中市。400 頁。
46. 徐堉峰。2013a。臺灣蝴蝶圖鑑（中）灰蝶。晨星出版有限公司，臺中市。336 頁。
47. 徐堉峰。2013b。臺灣蝴蝶圖鑑（下）蛺蝶。晨星出版有限公司，臺中市。384 頁。
48. 曹美華。2005。臺灣 120 種蜻蜓圖鑑。社團法人台北野鳥學會，臺北市。128 頁。
49. 國立台灣大學生態學與演化生物學研究所。2022。台灣植物資訊整合查詢系統。取自 <http://tai2.ntu.edu.tw>。
50. 陳昭全。2016。臺灣蝴蝶手繪辨識圖鑑。白象文化事業有限公司，臺中市。192 頁。
51. 馮雙、翁嘉駿、陳怡如。2010。臺灣地區保育類野生動物圖鑑。行政院農業部林務局，臺北市。399 頁。
52. 黃行七、旅晟智、徐堉峰。2010。台灣疑難種蝴蝶辨識手冊。中華民國自然生態保育協會，臺北市。140 頁。
53. 楊遠波、廖俊奎、唐默詩、楊智凱、葉秋好編著。2009。臺灣種子植物科屬誌。行政院農業部林務局，臺北市。231 頁。
54. 楊懿如、李鵬翔。2019。台灣蛙類與蝌蚪圖鑑。貓頭鷹出版社，臺北市。192 頁。
55. 廖本興。2022。台灣野鳥圖鑑：水鳥篇-增訂版。晨星出版有限公

- 司，臺中市。512 頁。
56. 廖本興。2021。台灣野鳥圖鑑：陸鳥篇-增訂版。晨星出版有限公司，臺中市。544 頁。
 57. 臺灣植物紅皮書編輯委員會。2017。2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄。特有生物研究保育中心、行政院農業部林務局、臺灣植物分類學會。187 頁。
 58. 鄭錫奇、方引平、周政翰。2010。臺灣蝙蝠圖鑑。特有生物研究保育中心，南投縣。143 頁。
 59. 鄭錫奇、張簡琳玟。2015。臺灣食肉目野生動物辨識手冊。特有生物研究保育中心，南投縣。63 頁。
 60. 鍾國芳、邵廣昭。2022。臺灣物種名錄。取自 <http://taibnet.sinica.edu.tw>。
 61. 台灣電力股份有限公司。2018。1060651A 離岸風力發電第二期計畫環境影響說明書（定稿本）。環署綜字第 1070012620A 號函。
 62. 橫太平洋快速海纜網路(TPE)系統施工計畫書。
 63. 台北線貢寮地區漁業之調查研究(2010)。台灣電力股份有限公司。
 64. 行政院農業部漁業署漁業年報(2010-2022)。
 65. 陳沛玲、莫顯蕎(2004)紅牙魚或 (*Otolithes ruber*)在臺灣西部沿海主要河口之分布調查與發聲機制研究。中山大學海洋生物研究所。碩士論文。
 66. 林淵智、莫顯蕎等(2008)大鼻孔叫姑魚(*Johnius macrorhynchus*)生物音學特性及發音肌蛋白質體學研究。國立臺灣海洋大學環境生物與漁業科學學系。

67. 邵廣昭等(2012)漁業資源保育區及稀有物種之調查及規劃。行政院農業部科技計畫研究報告。
68. 方智芳、陳炳煌、梁明煌等(2011)彰濱地區螻蛄蝦採集法對該族群恢復的影響及保育策略之研究。東海大學環境科學系。碩士論文。
69. 邵廣昭、劉仁銘(2015)苗栗縣人工魚礁區漁業效益調查礁區調查可行性評估。苗栗縣政府。
70. 邵廣昭 (2018) 離岸風機兼具人工魚礁及海洋保護區的正面效益。海洋及水下科技季刊，28 (3): 3-9。
71. 經濟部能源署網站
https://www.moeaea.gov.tw/ECW/populace/content/Content.aspx?menu_id=1001